



기니피그의 질병과 치료법에 대해서

Kelly

소개글

기니피그의 질병과 치료법에 대해서 알아보는게 기니피그를 키우는 주인으로서 매우 중요합니다.

기니피그는 자신이 아프면 아프다는 신호를 조용히 나타내지만 그 신호를 주인이 모르는 경우가 있습니다.

목차

1	건강한 기니피그에 대해서	4
2	기니피그에게는 어떤 비타민이 필요할까?	8
3	기니피그가 아플때: 당황하지 마세요	10
4	기니피그의 건강상태와 질병	13
5	기니피그가 아플때 자주 일어날수 있는 잘못된 생각들	16
6	기니피그가 피해야할 약 성분들	19
7	비타민 C 의 중요성	21
8	기니피그 질병: URI	23
9	기니피그 질병: Pododermatitis (bumblefoot)	26
10	기니피그 이가 부러졌으면???	30
11	기니피그 이가 부러졌을때 (2탄)	32
12	기니피그 이에 대해서: 부정교합	34
13	기니피그 질병: 링웜	37
14	기니피그 질병: 설사	39
15	기니피그 요로감염증에 대해서	40
16	결석에 대해서	42
17	기니피그 당뇨병에 대해서	44

18	기니피그가 음식을 안먹을때	46
19	기니피그 약 부작용	48
20	기니피그 질병: 소변으로 인한 열탕상	49
21	기니피그의 눈에 관에서	51
22	기니피그 털 관리의 기초	54
23	기니피그한테 기생하는 기생충 쉽게 잡기	56
24	기니피그 상태 파악하기: 임신 vs. 배에 살이 찼을때 vs. 가스	62
25	기니피그 노후에 대해서	64
26	기니피그 대변을 통해서 기니피그의 건강 알기	67
27	기니피그 소변을 통해 건강을 알아보기	71
28	기니피그 진드기 (개선충)	72
29	기니피그 수술할때 알아야 할 중요한 정보들	74

02.17 건강한 기니피그에 대해서

2009

가끔씩 기니피그를 키우다가 기니피그가 진짜로 건강한지, 아니면 아프지 궁금할 때가 있을거예요.
아주 쉽게 기니피그가 건강한지 체크하는 방법을 배워봅시다.



빅토리아 입니다. ^^

기니피그 코

기니피그 코 주변이 아주 깨끗해야 돼요.

아픈 기니피그 코:

- * 코 주변 털이 빠진다.
- * 콧물이 보인다.
- * 코 주변이 젖어있다.
- * 코 주변에 이상한 혹 같은게 보인다.

위에 이런 증상들 중 하나라도 보이면 건강에 무슨 문제가 있는 거니까 그때는 동물병원을 찾아 가셔서 검사를 받아 보세요.

기니피그 눈

눈이 맑고 깨끗해야 돼요. 만약에 하얀 물 같은게 기니피그 눈에서 나와도 아프건 아니니까 걱정 안하셔도 돼요. 하얀 물이 기니피그 눈에서 나오는 이유는 눈을 보호할때나, 아니면 그루밍을 할때 나오는 거예요.

아픈 기니피그 눈:

- * 눈이 한쪽이 감겨있다 (아니면 두쪽 눈이 다 감겨있다).
- * 흐릿한 눈
- * 폭 들어간 눈
- * 아주 많이 튀어나온 눈

기니피그 눈에 대해서 더 자세한 글은 (통하기 신청하시면 보실수가 있어요)


<http://blog.daum.net/kellysworld/7838779>

기니피그 귀

기니피그 귀를 봤을때 깨끗해 보이면 좋아요.

아픈 기니피그 귀:

- * 기니피그 머리가 한쪽으로 쏠리면서 걸을때 (귀 안 기생충 감염).
- * 귀 밖에 하얀 각질들 (링웜).
- * 부어 오른 귀 (염증).



위에 사진에 보이듯이 왼쪽은 기니피그 발에 생기는 각질이고 오른쪽 사진은 발에 수상한 피부병 같은게 나있는 사진이에요. 각질과 수
상한 반점같은건 매우 틀리게 생겼답니다.

기니피그 발

기니피그 발을 만졌을때 부드럽고 뽀송뽀송하면 좋은거예요. 또 기니피그 발톱이 너무 길면 안되요. 참고로 가끔씩 기니피그 발에 각질
같은게 생길수도 있어요.

아픈 기니피그 발:

- * 기니피그 발이 부어올라 있다.
- * 잘 걷지 못한다.
- * 발에 흑같은게 생겼다 (흑하고 각질은 둘다 틀리게 생겼어요).

기니피그 털

건강한 기니피그의 털은 윤기가 나고 털이 비어있는 부분이 없어요 (스키니 기니피그 빼고요 ^^).

아픈 기니피그 털:

- * 털이 아주 많이 빠진다 (기생충, 호르몬 문제).

- * 하얀 각질들이 많다.
- * 한군데에 동그랗게 털이 빠졌다 (링웬).
- * 기니피그 몸을 만질때 기니피그가 아파한다 (기생충).



왼쪽의 사진은 기니피그의 건강한 대변, 왼쪽은 기니피그가 먹는 식변. 식변을 자세히 보면 햇빛에 보면 초록색으로 보여요.

기니피그 대변

건강한 기니피그의 대변은 갈색에서 검은색이고 딱딱하고 타원형이에요. 가끔씩 기니피그 대변중 초록색을 띄고 타원형이지만 좀 부드러운게 있는데 그건 설사가 아니고 영양가가 들어있는 대변이라서 기니피그가 다시 먹어요.

아픈 기니피그의 대변:

- * 기니피그의 대변이 안나오고 계속 안에서 막혔다 (매복증: 보통 나이가 많은 수컷 기니피그에게 보이는 증상이예요).
- * 아주 조그맣게 생긴 대변 (보통 기니피그의 대변 모양이 아닌 아주 조그맣게 생겼으면 탈수증을 의심 하셔야 되요).
- * 설사 (박테리아에 감염되었거나, 아니면 물기가 너무 많은 간식을 너무 많이 먹어서).

기니피그 소변

기니피그의 소변 색을 맑거나 아니면 칼슘을 많이 섭취했을때는 흐릿한 흰색으로 나오는 경우가 있어요. 그럴때는 칼슘섭취를 줄이시면 되고요 (알파파 건초 대신 티모시 건초를 주시면 되요). 칼슘이 많은 소변이 마르면 하얀 가루같은게 보여요. 기니피그가 아주 어리면 소변 색이 오렌지에서 갈색을 띄는 경우가 있고, 소변이 마르면 색이 갈색으로 변해요.

아픈 기니피그의 소변:

- * 소변이 말랐을때 하얀 가루 같은게 만지니까 모래를 만진것처럼 까끌까끌 하다 (가루처럼 부드러우면 괜찮은 건데 까끌까끌 한건 병에 감염이 되었거나, 아니면 탈수증이에요).
- * 소변이랑 같이 나오는 피 (갈색빛이 아니고 소변에 피가 보이면 핑크빛이 보일거예요).
- * 기니피그 엉덩이 부분이 소변에 의해 많이 젖어 있을때 (단모종일 경우. 장모종일 경우는 엉덩이 부분 털이 길으면 소변에 의해 젖어 있으니 꼭 엉덩이 부분 털을 짧게 깎아 주세요).

요청이 있어서 이 글을 프린트 할수있는 파일을 첨부할께요.

Word 파일입니다.

다른곳에는 올리지 마시고 소장용으로 프린트해 주세요. 감사합니다.

 [건강한 기니피그에 대해서.docx](#)



기니피그에게는 어떤 비타민이 필요할까?

기니피그에게 꼭 필요한 비타민이 있는가 하면 필요하지 않는 비타민 들도 있어요. 기니피그가 필요 없는 비타민을 많이 섭취하면 건강에 문제가 생길수가 있어요.

비타민 C

건강한 기니피그는 하루에 적어도 10mg (비타민)/kg (기니피그 몸무게) 의 비타민 C 가 필요해요. 예를 들어서 기니피그가 1kg 이면 하루에 10mg 의 비타민 C 가 필요해요.

비타민 C 가 부족하면 건강에 여러가지 문제들이 생겨요. 비타민 C 에 대해서 자세한 글은 [여기로](#).

비타민 A

비타민 A 는 기니피그에게 따로 챙겨줄 필요가 없어요. 이미 기니피그에게 먹이는 펠렛에 (기니피그 전용 펠렛일 경우) 기니피그에게 필요한 소량이 첨가되어 있을거예요. 만약에 비타민 A 를 기니피그가 많이 섭취하게 된다면 임신한 기니피그는 출산할때 문제가 생기고, 건강한 기니피그들도 골격에 문제들이 생겨요.

비타민 D

비타민 D 는 기니피그에게 필요는 하지만 비타민 C 처럼 따로 챙겨주시지 않으셔도 돼요. 이미 기니피그에게 필요한 적당한 비타민 D 는 기니피그 펠렛에 대부분 포함되어 있으니까요. 비타민 D 를 기니피그가 따로 많이 섭취했을 경우 기니피그가 비정상적으로 자라게 되고 뼈는 물론 이빨까지 이상하게 자라게 돼요. **토끼들이 먹는 펠렛 (사료) 들에도 비타민 D 가 기니피그가 필요한 양보다 많이 들어있는 경우가 있으니 기니피그에게 절대로 토끼가 먹는 펠렛 (사료) 를 먹이면 안돼요.**

비타민 E


따로 챙겨줄 필요없는 비타민 이에요. 하루에 1.5~6 mg 정도는 괜찮다고는 하지만 아직까지는 양에 대해서 정확성은 없어요. 비타민 E 가 부족할 경우 골격 근육들이 퇴화되고, 생식 기능이 떨어지고, 심하면 죽음으로 갈수도 있어요. 하지만 역시나 비타민 C 처럼 매일 챙겨주실 필요는 없고, 보통은 기니피그 펠렛마다 다 필요한 영양분들이 들어있으니까 너무 걱정하지 마세요. ^^

비타민 K, 비타민 B, B6

비타민 K 와 비타민 B 는 기니피그가 자신의 분을 먹으면서 보충하고 있어요. 그에 대한 자세한 글은 [여기를](#).

Folic Acid (엽산, 다른 말로는 비타민 B9)

어린 기니피그에게 필요한 비타민 이라고 해요. (비타민 양 3~6mg)/(기니피그 몸무게 kg). 하지만 전 특별히 Folic Acid 는 따로 준적은 없었어요. 아마 제 생각에는 어린 기니피그가 먹는 펠렛에 따로 첨가 되어 있었다고 생각이 들어요.



건강한 기니피그도 가끔씩은 아파서 병원에 갈수도 있어요. 기니피그를 키우다 보면 기니피그가 아픈 증상을 보이면 당황해서 걱정되면서 어떻게 해결을 해야될지 모르는 주인들이 많다고 생각이 들어요, 저도 처음에 기니피그를 키웠을때 그랬거든요 ^^.

기니피그가 아플때는 제일먼저 당황하시면 안되요. 당황하시다 보면 주인도 스트레스 받고, 기니피그도 아파서 스트레스 받고, 이리저리 방향만 하게 된답니다. 기니피그가 아플때는 주인이 차근차근, 쿨~ 하게 대처해야 기니피그가 금방 괜찮아 진답니다.

기니피그가 아픈지 집에서 건강체크

	건강한 기니피그	아픈 기니피그
기니피그 모습	밝고 깨끗한 눈, 건강하게 보이는 털, 깨끗한 코, 반듯한 이빨, 깨끗한 입 주변	눈을 잘 못뜯, 힘이 없는듯한 눈, 털에 이상하게 윤기가 없다, 군데군데 빠져있는 털, 코 주변이 콧물로 의해 젖어있다, 입 주변이 젖어있다, 등등 비정상인 모습.
기니피그 행동	날쌔고 활발한 몸집, 물을 잘 마시고 음식도 잘 먹는다, 소변하고 대변을 잘 본다.	힘이 없는듯한 행동, 음식을 잘 안먹는다 (식욕이 없다), 물을 잘 안마신다, 소변과 대변을 잘 못본다, 구부정한 모습 등등.

그 밖에 기니피그가 아픈지 집에서 체크하는 방법은 이 글들을 확인해 주세요.

<http://blog.daum.net/kellysworld/7838831> (건강한 기니피그에 대해서)

<http://blog.daum.net/kellysworld/7838942> (기니피그 대변에 대해서)

기니피그가 아프지 않더라도 미리 해야 할 행동:

* 미리 근처에 어떤 동물병원이 있는지, 그리고 그 동물병원에서 기니피그를 보는지 알아보시는게 좋아요. 한국은 기니피그를 보는 동물병원이 그리 많지 않기 때문에 미리미리 동물병원에 대한 정보들을 찾아보시는게 나중에 기니피그가 아플때 도움이 많이 된답니다. 주변에 기니피그를 보는 동물병원이 없으면 좀 멀더라도 차로 갈수있는 기니피그를 잘 보는 동물병원을 찾으시는것도 좋아요. 차를 운전 못하시는 분은 주변 사람들 중 차를 운전할수 있는 사람에게 미리 부탁을 하시는 것도 좋은 방법 중 하나예요.

* 동물병원 진찰비와 약값, 그리고 수술이 필요할때는 수술비 (기니피그가 수술할 확율을 매우 낮으니 너무 수술비 같은건 너무 부담 가지지 않으셔도 되요), 등등 여러 병원에서 부담되는 돈들을 지금부터 마련하시면 나중에 기니피그가 병원에 갈때 돈에 대한 부담이 없이 병원에 가실수 있어서 스트레스가 쌓이는걸 예방할수가 있어요. ^^ 학생같은 경우는 가끔씩 기니피그 병원비에 대해 부담이 될수도 있으니 지금부터 차근차근 만약을 위해 모아두신다면 도움이 많이 된답니다.

기니피그가 아플때:

1) 기니피그가 아픈걸 알아챘을때 제일먼저 해야할 행동은 바로 아픈 기니피그하고 아프지 않는 기니피그를 따로 다른 케이지 안에 각각 분리해 놓으셔야 되요. 아픈 기니피그가 아프지 않는 기니피그에게 병을 옮길수도 있거든요.

2) 미리 알아본 동물병원에 전화를 하셔서 예약을 하시면 좋아요.

3) 아픈 기니피그들은 여러 교통수단을 이용할때 스트레스를 받을수도 있으니 기니피그를 데리고 병원에 갈때는 기니피그 전용 케리어를 이용하세요 (고양이 용도 좋고요, 작은 강아지 용도 좋아요). 케리어가 없을 경우 박스를 이용하시게 될 경우에는 기니피그가 들어있는 박스안이 어둡게 수건같은걸로 윗부분을 살짝 덮어주셔도 좋아요. 기니피그를 케리어라던지 박스로 이동을 하실때 기니피그 냄새가 배어있는 베딩을 조금 넣어주시면 기니피그가 스트레스를 덜 받는다고 해요.

4) 병원에 갔다오셨으면 수의사 선생님이 처방해준 약은 처방전에 따라 꼬박꼬박 주시고, 케이지 주변은 되도록이면 어둡고 조용하게 해주세요. 기니피그 주변은 젖어있지 않게 젖어있는 베딩을 (수건이나 형겁을 깔았을 경우에는 젖어있는 수건과 형겁을) 자주 갈아주세요.

5) 기니피그가 먹던 음식은 매일매일 다 안먹어도 새 음식으로 갈아주시고 (건초, 펠렛), 물도 매일매일 갈아주시고 물통과 펠렛그릇은 매일 매일 씻는게 좋아요.

6) 아픈 기니피그를 만지고 나서는 꼭 손을 물과 비누로 깨끗하게 씻으세요.

7) 기니피그가 괜찮아 졌나 매일매일 확인하시고 혹시나 기니피그가 약 부작용이거나 1주일에서 2주일 후에도 괜찮아 지는 모습이 안보이면 빨리 방문했었던 동물병원에 전화를 해주세요.

동물병원에 갔을때 수의사 선생님께 해야 할 행동:

궁금한 점들을 미리 종이에 써서 동물병원에 가지고 가면 수의사 선생님을 만날때 까먹지 않고 여쭙어 볼수가 있어요. 그리고 진찰 받아야 되는 기니피그에 대한 정보들을 수의사 선생님께 말하면 수의사 선생님이 기니피그를 진찰하고 약을 처방할때 많은 도움이 된답니다.

수의사 선생님께 말하면 도움이 되는 정보 (다 필요는 없고 대답할수 있는 답만 있어도 좋아요, 많으면 많을수록 수의사 선생님이 기니피그를 진찰할때 도움이 된답니다)

- * 기니피그의 나이 (태어난지 몇개월, 아니면 몇년?)
- * 얼마동안 (진찰을 받고 있는 아픈) 기니피그를 키웠나요?
- * 언제부터 기니피그가 아픈 증상을 보였나요?
- * 기니피그 증상 (잘 못걷는다, 숨을 쉴때 거칠게 쉰다, 기침한다 등등)
- * 전에도 비슷한 증상때문에 치료를 받은적 있었나요?
- * 마지막으로 언제 음식을 먹고 물을 마셨나요? (오늘? 어제? 2틀전에? 등등)
- * 기니피그 음식을 최근에 바꾼적이 있었어요? (펠렛을 바꿨어요, 건초를 바꿨어요, 새로운 간식 등등)
- * 언제 마지막으로 기니피그가 대변을 먹었었나요? (식변)
- * 기니피그 말고 다른 동물도 키우고 있나요?
- * 다른 기니피그랑 같이 살고 있나요? (케이지 안에 몇마리의 기니피그들?)
- * 케이지 청소는 언제 하나요? (1주일에 3번? 4번? 몇번?)
- * 기니피그가 암컷일 경우: 임신한 한적이 있는지, 언제 했는지, 현재 임신중인지
- * 같이 키우는 기니피그들 에게도 비슷한 증상이 보이고 있나요?

기니피그를 잘 보는 동물병원을 추천해 주시면 감사합니다. ^^

댓글에다가 적어주시면 좋아요~



기니피그의 건강상태와 질병

문제: 증상: 원인: 해결법

상처: 염증, 붉음, 부풀어오름, 감염, 아픔, 고름: **다른 동물과 싸웠을때:** 상처를 깨끗이 소독시키고 약을 발라주세요.

몸이 부어올랐을때: 하복부가 팽창 (위가 팽창), 배 안이 가스와 물로 꽉 찼을때, 고통을 호소할때, 밥을 안먹을때, 활기가 없다, 숨을 어렵게 쉰다, 심장이 빨리될때: **음식문제** (보통 채초를 너무 많이 주었을때), **스트레스**, **박테리아**, **바이러스 감염:** 생명이 위험하니까 재빨리 병원에 데려가세요.

부러진 이빨: [이거에 대해서 자세히 쓰게 있어요. \(링크했어요\)](#)

암: 식욕이 없다, 몸무게가 줄어든다, 우울해보인다, 움직임이 없다, 가끔씩 몸에 혹이 보이는 경우가 있다: **나이가 많을때, 바이러스에 감염, 유전으로 이어지는 암:** 기니피그를 편안하게 해주고 병원에 가서야되요. 수술로 암을 제거해야되요.

백내장: 흐릿하고 탁한 눈: **당뇨병 증상, 너무 많은 설탕양, 단백질 부족, 소에서 나오는 우유를 마셨을때 걸릴 확률이 많아진다:** 병원에 가야되지만 아직까지는 완벽한 치료법이 없어요.

변비, 매복증: 건조한 배설물, 우울해보인다, 무기력, 몸을 구부린다, 건조하고 거친 털, 넓어진 하복부: **수분부족, 탈수증, 몸** **에 열이 많다, 기생충:** 이유를 안다음에 수분이 많은 간식을 주고, 항문을 따뜻한 물에 젖힌 수건으로 깨끗하게 해주세요. 심한 경우에는 수의사한테 연락을 하는게 제일로 좋은 방법입니다. 만약에 기니피그가 똥을 먹는 행동을 안보인다면 비타민 B 와 K 를 보충해 주셔야 됩니다. 아주 아주 심한 경우는 수술을 해야됩니다.

탈수증: 털이 거칠고 의욕이 없다, 무기력, **혼수상태:** **일사병, 더운곳에서 오래 있었을때, 박테리아, 바이러스 감염:** 일사병이나 더운곳에서 오래 있었을때 탈수증이면 시원한 물을 세면대에 받아서 기니피그를 담가주세요 (물을 기니피그 몸의 반만 채워주세요). 만약에 박테리아, 바이러스 때문에 생기는 탈수증이면 당장에 병원에 가셔야 됩니다.

설사: 이거에 대해서 자세히 쓰게 있어요. (링크했어요)

귀에 관한 문제: 계속 긁는다, 머리를 흔든다, 균형을 못잡는다, 머리가 한쪽으로 기울어졌다, 아파한다: **감염 (연쇄구균, 보테** **텔라 브론키셉티카 (그람음성균), Klebsiella, 파스튜렐라, 악티노바실루스), 기생충:** 동물병원에 가시면 수의사 선생님이 X-ray 로 찍은다음에 이유를 찾으실거예요.

눈에 관한 문제: 눈에서 계속 물이 흘러내린다, 흐리고 뿌연 눈: **감염, 눈을 다쳤을때, 염증을 생기게 하는 어떤 물질이 눈에 들어갔을때, 병이 있다는 신호:** 어두운 곳에 기니피그를 있게하고, 다른 기니피그랑 격리시켜주세요. 눈에 이상이 있으면 수의사한테 연락을 해두시는게 좋아요. 그 이유는 호흡기관에 무슨 문제가 있으면 제일먼저 눈에 이상이 오거든요. 큰 병일수도 있으니까 꼭 병원에 데려가주세요.

털빠짐: 군데군데 빠진 털들, 부분적으로, 아니면 전체적으로 빠진 털들: 같이 살고있는 기니피그가 털을 뽑았을수도 있고, 혼자 털을 뽑을수도 있고, 털갈이, 기생충, 스트레스 등등, 이유야 아주 많아요: 은신처가 없으면 은신처를 주시고, 이갈이용 나무를 넣어주세요. 만약에 기생충때문에 털이 빠진거면 병원에 가서서 피부병 약을 사서 발라주시면 돼요. 링월에 관한건 링크했어요.

골격에 관한 문제: 아픔, 마비상태, 몸 상태가 뻣뻣하다, 몸무게가 많이 줄어든다, 입맛이 없다, 무기력: **비타민 C, D, 아니면 E 가 부족, 관절염:** 일단 수의사랑 상의해서 원인을 알아야되요.


발톱: 이거에 대해서 자세히 쓰게 있어요. (링크했어요)

Pododermatitis (족저궤양???): 이거에 대해서 자세히 쓰게 있어요. (링크했어요)

호흡기관 문제: 숨을 힘들게 쉰다, 기침 (재채기가 아닌 "쿨룩" 하는 소리), 코와 눈에서 물같은게 나온다, 입맛이 없다, 움직임이 별로 없다, 몸무게가 줄어든다: **박테리아, 바이러스 감염, 알러지, 외풍, 추운날씨, 습기가 많은 곳에 있을때, 허파에 암:** 이 병은 옛날에 세바스찬과 빅토리아가 둘다 걸린 병이라서 이 병에 관해서는 좀 예민해요. 무서운 병이라고 해야되겠죠. (여기 미국에서는 URI 이라고 합니다) 저 같은 경우는 빨리 발견해서 의사선생님이 약만 처방해 주셨어요. 일단 기니피그가 이 병에 걸리면 다른 기니피그랑 격리시켜야 됩니다. 너무 오래 놔두시면 수술, 더 심하면 죽음까지 가는 위험한 병이에요. 이 병에 대해서는 제가 나중에 더 상세하게 쓰겠습니다.

요도감염: 몸무게가 줄어든다, 입맛이 없다, 무기력, 소변볼때 힘들어 한다 (아파서 소리내면서 소변을 보는경우도 있어요), 소변에 피가 섞여서 나온다 (암컷: 소변에 피가 섞여서 나온다. 수컷: 오줌눌때 힘들어 하거나 아파한다). 어떤분은 기니피그 암컷이 생리를 하다고 하지만 기니피그는 원래 생리를 안하는 동물입니다. 기니피그 암컷이 출혈할때는 ONLY 아기날때 바로 전, 그리고 후에 약간 하는겁니다: **방광안에 돌이 들어 있을때, 요도가 박테리아에 감염, 잘못된 음식 (기니피그 나이가 6개월**

이 넘었는데 계속 알파파 건초를 주식으로 할때): 수의사한테 연락을 재빨리 해야됩니다. 보통 돌을 빼낼때 수술로 하지만 어떤경우는 약으로 해결되는 경우도 있습니다. 이 경우는 돌이 작을 경우에 해당되는 거고 돌이 크면 수술로밖에 해결이 안됩니다. 알파파 건초가 성인 기니피그들한테 나쁜 이유는 알파파는 칼슘하고 옥살산염이 많이 들어가 있기 때문입니다.



기니피그가 아플때 자주 일어날수 있는 잘못된 생각들

기니피그들은 어디가 아플때 절대로 아프다고 주인에게 신호를 보내주지 않아요, 그래서 항상 주인이 기니피그가 어디가 아프는지 꼭 검사를 해주셔야 되고 또 그에 맞는 지식도 어느정도 아셔야 나중에 기니피그가 아플때 도움이 되요. 아픈 기니피그를 고칠때 잘못된 판단에 의해서 기니피그가 더 아픈 경우도 많이 보았기 때문에 이번이 이 글이 도움이 되고자 합니다.

자주 일어나는 실수들 (주인 & 수의사)

1. 약이 꼭 필요한 병인데 "언젠가는 괜찮아 지겠지" 라고 생각.
2. 수의사를 찾아가는걸 미루는 행동 (늦게 찾아갈수록 기니피그 병이 악화되고, 그로 인해서 병원비가 더 나갈수도 있어요)
3. 기니피그 전문 수의사가 아닌 다른 수의사를 찾아가는 경우.
4. 무조건 수의사가 처방해 주는 약을 질문과 조사도 없이 받아들이는 행동.
5. 기니피그 질병에 대해 검사도 안하고 대충 증상만 보고 약을 처방해 주는 행동.

6. 한꺼번에 많은 질병이 있음에도 불구하고 한가지의 병만 있는줄 알고 그 약만 처방해 주는 경우.
7. 잘못 처방된 약, 약의 양을 잘못 계산.

각 질병에 대한 오해와 실수들에 대해 알아보시다.

상기도감염 (호흡기관에 문제, URI: Upper Respiratory Infections)

1. 그냥 알려지라고 생각하는 경우.
2. 약으로 처방해야 되는 병인데도 불구하고 그냥 방치하는 행동.
3. 잘못 처방된 약: URI 는 Baytril 이라는 약이 많이 처방이 되지만 가끔씩 어떤 박테리아는 이런 약이 안통하는 경우가 있어요.
4. URI 병이 아니고 기니피그 심장에 문제가 있을때: 기니피그 심장에 문제가 있을때도 증상이 URI 랑 많이 비슷해요, 하지만 그에 맞는 약은 틀리답니다.
5. 다른 약은 처방 안하고 오직 URI 에 대한 약만 처방하는 경우: 기니피그가 상기도감염에 걸렸을 경우 심하면 폐렴으로 갈수도 있어요, 그렇기 때문에 약만 처방하면 안되는 경우도 많아요. 아주 심하게 URI 에 걸렸으면 다른 약들도 필요로 할수도 있어요.

요로 감염증 (Urinary Tract Infection)

1. 기니피그가 몸안에 결석이 있을거 같은 증상에도 불구하고 괜찮다고 생각하는 행동.
2. 기니피그가 소변을 볼때 아파함에도 불구하고 증상에 대해 잘 모르기 때문에 그냥 방치하는 행동.
3. 기니피그 몸안에 결석이 있음에도 불구하고 x-ray 를 안찍는 경우: 기니피그 몸안에 결석이 있다고 해도 x-ray 는 꼭 찍으셔서 결석이 얼마나 큰지 아셔야 되요, 그래야 약으로 처방을 할건지, 아니면 수술로 결석을 꺼내야 하는지 알아야 되거든요.
4. 기니피그 수술 후에 다른 처방을 안할때: 기니피그 몸안에 수술로 결석을 꺼냈다고 다 끝난건 아니예요. 수술 후에 그 부분이 부어 오를수도 있어요, 그리고 또 다른 경우에는 수술 후에 설사를 할수도 있고 배가 부풀어 오를수도 있어요.


부정교합 (malocclusion)

1. 앞니만 검사하고 어금니는 검사 안할때.

2. 앞니는 치료하는데 어금니는 치료 안할때.

3. 기니피그가 몸무게가 줄어드는데 기니피그 부정교합은 생각 안해보고 다른 질병에 대해서 생각할때: 기니피그를 잘 보는 수의사도 가끔씩 기니피그 부정교합을 놓치는 경우가 있어요.

다른 질병에 대해서 생각이 나면 더 추가 할게요. 이 글을 읽으시고 다른 질병에 대해 생각하시는 분들도 댓글에다가 써주세요. 감사합니다.



페니실린 계의 항생제들은 기니피그들에게 치명적이에요. 기니피그에 대해 잘 모르는 수의사들이 가끔씩 기니피그들에게 **아목시실린** 을 처방해 주는 경우가 있는데 그러면 즉시 다른 수의사를 찾아가주세요. 절대로 기니피그에게 페니실린 계의 항생제를 먹이면 안되요.

기니피그에게 절대로 먹이면 안되는 약, 항생제 종류들

- amoxicillin (Clavamox) - 아목시실린: 페니실린계의 항생제예요.
- ampicillin - 암피실린: 페니실린과 비슷한 항생제예요.
- bacitracin - 바시트라신: 보통 연고에 많이 쓰이는 성분중 하나이지요.
- cefadroxil - 세파드록실: 항생제, 마이신 비슷한 약이에요.
- cephalexin - 세팔렉신: 중이염, 폐렴, 기관지염에 사용하는 항생제 중 하나라네요.
- cephalosporins - 세팔로스포린: 페니실린과는 많이 틀린 항생제지만 역시나 기니피그에게 위험한 약중 하나예요. 진균 세팔로스포룸에서 얻는 항생 물질이에요.
- cephalozin - 세팔졸린이라고 읽는건가 본데.... 이거에 대해서는 자세한게 없네요.
- chlortetracycline - 클로르테트라사이클린: 토끼가 스너플 이라는 병에 걸리면 이 약으로 치료를 하는 모양인데 기니피그에게는 치명적인 약 성분이에요.
- clindamycin - 클린다마이신: 여드름 약에 많이 쓰이는 성분이에요.
- dihydrostreptomycin - 디하이드로스트렙토마이신: 결핵 치료제
- erythromycin - 에리트로마이신: 역시 여드름에 많이 쓰이는 성분인가봐요.
- lincomycin - 린코마이신: 페니실린 저항균에 효과 있는 항생 물질이에요.
- oxytetracycline - 옥시테트라사이클린: 항생제 종류중 하나인거 같은데... 자세한는 모르겠어요.

- **penicillin** - 페니실린: 연고에 많이 쓰이는 성분중 하나이지요.
- **streptomycin** - 스트렙토마이신: 결핵 치료용 항생 물질이에요.

기니피그가 아파서 수의사 선생님이 기니피그가 먹는 약을 처방해 주셨을때 한번 이 리스트를 꼭 읽어보세요. 혹시나 약중 위에 써져있는 성분이 하나라도 있으면 즉시 다른 약을 처방해 달라고 하세요.



기니피그들은 비타민 C를 혼자서 스스로 만들어 낼수 없기 때문에 음식에서 비타민 C를 직접 섭취를 해야되요.

기니피그들은 하루에 적어도 5mg / 기니피그 몸무게 (파운드당) 의 비타민 C 가 필요해요 (10mg / kg). 그리고 만약에 임신을 했을 경우 하루에 15mg / 임신한 기니피그 몸무게 (파운드당) 이 필요하고요 (30mg / kg).

기니피그 몸에 비타민 C 가 부족하면 많이 아파합니다. (잇몸이 부어올르고, 뼈도 이상해 지고, 잘 걷지도 못하게 되요) 심하면 죽는 경우도 있습니다.

비타민 C 결핍증 증세

- 잘 움직이지 못한다
- 잇몸이 부어올른다
- 잘 걷지 못한다
- 털이 뿔뿔해 진다
- 뼈와 혈관이 이상하게 변한다
- 몸무게가 줄어든다

기니피그들에게 비타민 C 를 주는 방법은 참 많아요. 야채와 과일에도 비타민 C 가 들어 있습니다. 또 기니피그용 펠렛에도 비타민 C가 들어있고요. 하지만 전 야채와 펠렛으로도 왠지 부족하다는걸 느껴요.

전 기니피그들 먹는 펠렛과 야채에도 비타민이 들어 있다고 해도 확실하게 비타민 C 타블렛을 더 먹고 있어요. 기니피그들은 비타민 C 하루 섭취량을 넘어도 위험하지가 않아요, 하지만 비타민 C가 부족하면 많이 위험해 저요.

기니피그 물에 타먹이는 비타민 C 가 있고 기니피그들 에게 직접 먹이는 비타민 C 타블렛이 있어요. 물에다가 타먹이는 비타민 C 는 비타민이 물에 들어가면 많이 파괴가 된답니다. 또 기니피그들이 물안에 비타민 C 맛을 느낄수 있다면 물을 잘 안마시게 되요.

직접 먹이는 비타민 C는 제가 기니피그들에게 먹이는 방법인데요... 전 옥스보우에서 만든 비타민 C 타블렛을 먹고 있어요. 또 다른 곳은 약국에서 어린아이들이 먹는 비타민 C 를 사서 1/4 등분해서 먹이는 거예요. (중요한 점은 다른 비타민이 안들어간 100% 비타민 C 를 사세요)

만약에 기니피그가 비타민 C 결핍증을 가지고 있으면 응급처치로 이렇게 해보세요.

- * 비타민 C 타블렛 250mg 을 잘게 부신다.
- * 싱싱한 포도를 쥙~ 짜낸다. (3ml 정도의 주스를 만들어 낸다) 씨앗은 버리세요.
- * 신선한 오렌지 주스 3ml
- * 신선한 물 2ml
- * 준비한 것을 다 섞는다.
- * 바늘없는 주사기를 이용해서 비타민 C 결핍증을 가지고 있는 기니피그에게 먹인다.
- * 주의: 천천히 먹이셔야 되요. 기니피그가 삼킬수 있는 시간을 주세요.*



기니피그 호흡기관에 문제중 URI 라는 무서운 병이 있어요. 제가 키우는 기니피그들 중 세바스찬과 빅토리아가 이 병에 걸려서 꽤 고생을 했었어요.

증상

URI 의 증상은 숨을 힘겹게 쉬고, 숨쉴때 마다 툭툭 소리가 나고, 눈에 이상이 있고 (빅토리아 같은 경우는 오른쪽눈을 아예 못떴었어요), 눈과 코에서 분비물들이 나오고, 기침, 너무나 잦은 재채기, 음식을 잘 안먹고, 힘이 없고, 등등, 많은 증상들이 있어요.

기니피그가 URI 병 증상들중 하나라도 보이면 즉시 수의사한테 가셔야 돼요. "설마... 수의사한테 안가도 괜찮겠지" 라고 생각하시면 큰 일나요. 기니피그는 URI 라는 병에 걸렸을때 오래 놔두면 죽음으로 가는 무서운 병이기 때문이에요. (참고로 기니피그는 감기 바이러스에 안걸려요) 절대로 감기겠지 라고 생각하시면 안돼요.

URI, 보통 박테리아 감염때문에 생기는 병은 펫마트에서 파는 기니피그한테 많이 생기는 병이에요. 그만큼 많은 기니피그가 이 병에 걸려서 펫마트로 부터 새로운 주인에게 가기 때문에 기니피그가 오자마자 죽으면 주인도 이유를 알지 못하는 경우도 많아요. 기니피그가 처음 집에 도착했으면 잘 관찰을 하는게 좋은방법이에요.

세바스찬한테 나타났었던 증상

콧물, 기침 (쿨럭쿨럭), 살이 빠지고 몸집이 다른 토레 기니피그에 비해 작다, 털이 부시시해졌다, 털이 까칠까칠해졌다, 먹는건 잘 먹는데 몸 움직임에 힘이 없다.

빅토리아에게 나타났었던 증상

잘 걷는거 같은데 활발하지가 않다, 눈 한쪽을 눈병걸린것 처럼 뜨지를 못한다, 몸이 매우 말랐다.

URI 생기는 이유


URI 가 생기는 이유는 스트레스, 키우는 환경, 다른 기니피그에게 옮았을때, 등등... 제 생각에 세바스찬이 URI 걸린 이유는 제가 그 시절때 기니피그에 대해 잘 몰르던 시절때 세바스찬이 살고있던 케이지를 시원하라고 에어컨 바로 옆에다가 놔뒀거든요, 그래서 찬 바람을 계속 쐬게 맞아서 걸린거라고 생각합니다 (지금도 엄청 후회하고 있어요). 빅토리아 같은 경우는 펫마트에서 데리고 왔을때 이미 걸려있던 병이었어요. 데려온지 3일만에 눈에 이상이 있다는걸 알고 병원에 갔더니 URI 이라네요. 다행히 빨리 발견을 해서 박테리아가 심장까지는 안갔었어요.

- * 원래 처음 왔을때부터 생기는 경우가 많으니 반드시 처음 기니피그를 입양 했을때 잘 관찰해 주세요.
- * 바람이 부는곳에 케이지를 놔두었던 경우 (저 같은 경우는 케이지를 에어컨 바람이 뽕뽕 부는 곳에 놔두어서 그만...ㅠㅠ)
- * 먼지가 많은 베딩을 쓸 경우
- * 케이지 근처에 먼지가 많을 경우 (집안에 먼지가 많아도 문제가 있어요)
- * 스트레스
- * 다른 기니피그에게 옮았을때

그럼 수의사 선생님은 어떤 검사를 하실까요?

기니피그 몸의 수분레벨 검사, 허파와 심장소리를 청진기로 검사, 어떤 경우는 허파안에 물이 들어갔는지 x-ray 로 검사, 그리고 마지막으로 기니피그에게 URI 를 일으키는 박테리아에 대해 자세히 검사한 다음에 그에 맞는 약을 처방해 줍니다.

치료법



치료법이 다양해요. 세바스찬과 빅토리아는 두분의 의사 선생님들이 각각 다른 처방을 내려주셨어요. 세바스찬은 그냥 물약을 처방해 주셨어요 (약 이름이 sulfamethoxazole-tmp susp hit 이라는 거였어요). 그에 비해 빅토리아는 눈까지 이상해지는 바람에 물약 (이름을 잘 몰라요), 몸안에 나쁜 박테리아 죽이는 약 (사진중 2번째 사진, 주사기 처럼 생긴거예요), 그리고 안약을 처방해 주셨어요(맨 마지막 사진). 세바스찬과 빅토리아 둘다 2주만에 깨끗히 다 괜찮아졌어요.

기니피그들 질병중에서 Pododermatitis 라는 병이 있어요. Pododermatitis 를 bumblefoot 이라고 부르기도 해요. 중요한건 발에 생기는 피부병이라고 생각하시면 됩니다.

Pododermatitis 라는 병이 생기데에는 여러가지 이유들이 있습니다.

똥똥한 기니피그가 와이어 바닥인 케이지에서 생활을 하거나, 지저분한 환경, 거친베딩, 아니면 발에 생긴 상처로부터 staphylococcus (포도상구균) 에 감염이 되면서 발이 부으면서 생기는 병이에요.

Pododermatitis 에 걸린 기니피그의 발 사진이에요. 제가 사진을 안 가지고 있기 때문에 링크를 걸어둘게요.

<http://www.guinealynx.info/pododermatitis.html>

이건 건강한 기니피그 발 사진입니다. 빅토리아양에게 특별히 부탁해서 찍은 사진입니다.
고마워~ 빅토리아~ 🍒



건강한 기니피그들 발은 만지면 뽕뽕해요. 물론 빅토리아는 발을 만지는걸 아주아주 싫어하지만 간식으로 부탁을 하면 (뇌물입니다) 한번쯤은 만지게 해줘요. ㅎㅎ

기니피그가 Pododermatitis 가 생기면 여러가지 치료법이 있어요.

- * 수술을 해서 제거합니다. (아주 심한경우, 보통 x-ray 로 검사한다음에 어느 부분을 수술할지 결정합니다)
- * 약을 먹이거나 몸안에다가 약을 주사합니다. (덜 심한경우)
- * 발을 betadine (베타다인, 베타딘 = 소독약 종류예요) 아니면 chlorhexidine solution (클로르헥시

딘) 에다가 하루에 한번 아니면 두번정도 적셔줍니다. (이 경우는 의사랑 먼저 상담을 한다음에 집에서 충분히 할수있는 치료법이에요)

소중한 기니피그가 Pododermatitis 에 걸리기 전에 예방 하는게 중요하겠죠?

* 부드러운 베딩을 써주세요.

* 바닥이 와이어인 케이지면 기니피그들이 발을 편히 쉴수있게 수건같이 부드러운걸 깔아주세요.

* 기니피그 발톱을 깎을때 항상 발을 잘 살펴주세요. 만약에 Pododermatitis 가 의심스러우면 즉시 의사 선생님께 연락해주세요. (전 한때 제 기니피그들 발에 이상하게 생긴게 있길래 의사 선생님을 찾아갔더니 그냥 각질이라네요... 다행입니다. 휴~)

*기니피그가 너무 살찌지 않게 주의해 주세요. 간식을 적당히, 펠렛도 적당히, 그대신 건초는 24/7.



위에 사진이 바로 기니피그 발에 생긴 각질입니다.
발에 생긴 각질은 사진이 지나면 저절로 떨어지니 너무 걱정 안하셔도 되요.

흠... 한번 아는데로 써봤네요. 만약에 부족한게 있으면 꼭 가르쳐주세요. 감사합니다. ^^ (꾸벅)

08.29
2008

기니피그 이가 부러졌으면???

기니피그 앞니가 부러졌으면 걱정하지는 마세요. 기니피그 앞니들은 계속 자란답니다. 하지만 걱정해야 될거는 바로 안부러진 앞니들이예요.

예를 들어서 윗니가 부러졌는데 아랫니는 멀쩡해요. 물론 윗니하고 아랫니 둘다 자라겠지만 아랫니가 윗니보다 이보다 더 길어지겠죠... 그렇게되면 앞니들 길이가 달라지게 되요. 결국 기니피그가 건초와 펠렛들을 잘 못먹게 되요.



정상적인 기니피그의 이빨

기니피그가 음식을 잘 먹지 못한다고 생각이 들면 즉시 기니픽의 이빨을 확인하는게 좋아요. 기니피그의 이빨이 너무 길지는 않는지, 아니면 부러졌는지 꼼꼼하게 체크를 해주셔야 되요.

부러진 이는 다시 원데대로 자라고 정상적으로 건초를 먹는다면 원래 크기로 자랄수도 있지만, 만약에 경우에는 부러지지 않는 이빨이 너무 많이 자랄수도 있습니다.

만약의 경우에 대비해서, 부러진 이가 다시 자랄때까지 안부러진 이를 동물병원에 데리고 가서서 조금씩 잘라 주셔야 되요. 사실 기

니피그 이를 자르는건 집에서 혼자하려면 힘들어요, 잘못 자르다가 기니피그의 이빨이 갈라질수도 있고요.

물론 다 동물병원에 데리고 가야하는건 아니니 기니피그의 이빨이 부러졌으면 이빨이 잘 자라는지 매일 확인을 해 주시고 조금이라도 기니피그의 이빨에 이상하다고 생각이 드시면 즉시 동물병원에 데리고 가 주시기를 바래요.

참고로, 기니피그의 이빨을 동물병원에서 검사를 할때 앞니와 같이 어금니도 같이 검사를 해달라고 하시면 좋아요.

06.14 기니피그 이가 부러졌을때 (2탄)

2009

자주 일어나는 일은 아니겠지만, 가끔씩 기니피그들을 키우시는 분들중 기니피그 이가 부러지는 경험하신 분들이 계실거예요. 저도 아직까지는 이런일이 한번이 일어난적이 없는데... 저한테도 이런일이 일어났다면 당황스러워 했을거 같아요.

그래서 제가 기니피그 이가 부러졌을때를 대비해서 자료를 찾아봤어요. 제가 옛날에 글을 올린것들중 기니피그 이빨이 부러졌을때에 관해서 쓴 글이 하나 있는데 그렇게 정확한 자료가 아닌거 같아서 자료들을 충분히 찾아서 다시 한번 써요.

기니피그 이빨이 부러지는 이유

- * 어디에서 떨어지거나 다쳤을때 이빨이 깨졌을 경우.
- * 영양가가 부족했을 경우 이빨이 약해졌을때
- * 비타민 C 가 부족했을때 (비타민 C 는 기니피그 뼈와 이빨을 튼튼하게 해주는 중요한 역할도 합니다).

기니피그 이빨이 부러졌을 경우

수의사가 필요 없을때

보통 건강한 기니피그의 이빨이 부러졌을 경우 다시 잘 자란다고 해요, 다만 부러진 이가 다시 자랄때 안부러진 이가 너무 길어져서 잇몸이나 입근처 살이 닿지않게 조심해 주시면 되요.

만약에 이가 너무 많이 부러져서 그 부분에 구멍이 보이고 잇몸에 피가 보일 경우 이빨이 다시 생길때 까지 자주 생리식염수 (saline solution) 으로 소독해 주시면 되요. 만약에 생리식염수를 구하지지 못하면 소금물로 소독해 주시면 되요.

수의사가 꼭 필요할때

기니피그 이빨이 자랄때 어떤경우는 뼈뿔뿔 하게 자랄수도 있어요. 그때는 의사 선생님을 찾아가시면 예쁘게 반듯하게 이빨을 잘라주실 거예요.

다른경우:

- * 이빨이 자라는 방향이 입 안을 향할때.
- * 기니피그가 음식을 안먹을때.
- * 잇몸이 부어있을때.
- * 기니피그가 음식을 먹을때 부러진 이빨로 인해 많이 아파할때 (이런경우 잇몸 상처).

음식

이빨이 부러졌지만 음식을 잘 먹는 기니피그가 있는가 하면 음식을 잘 못먹는 기니피그들도 있어요. 기니피그가 음식을 잘 먹는다면 다행이지만, 만약에 음식을 잘 못먹으면 음식 (이런 경우에는 건초, 야채, 과일들) 을 기니피그가 먹을수 있게 잘게 잘라주시면 되요. 기니피그가 급수기 (물마시는 물통) 을 부러진 이빨로 인해 잘 못쓴다면 직접 바늘없는 주사기로 물을 먹여주시면 되요.

꼭 기억해야 될것들

- * 비타민 C 는 기니피그 뼈와 이빨을 튼튼하게 해주는 중요한 성분이에요.
- * 경험이 별로 없는 의사 선생님이 가끔씩 하시는 실수인데, 기니피그 이빨을 자를때 (뼈뿔뿔 자란 이빨, 입 안쪽으로 자란 이빨) 너

무 짧게 자르면 기니피그가 음식을 못먹을 수도 있어요.



이빨이 부러지면 다 자랄때 까지는 보통 2~3주 정도 걸린다고 해요. 위에 사진은 3주동안 부러졌던 기니피그 이빨이 다시자라는 모습이에요.

기니피그는 총 20개의 치아를 가지고 있어요, 그 중 두개의 아래와 위에 있는 앞니들을 계속 자란답니다. 건강한 기니피그의 치아는 보통 설치류랑 달리 하얀색이에요 (밝은 상아색).

기니피그 이에 대해서 다른 정보는

<http://blog.daum.net/kellysworld/6432241>

기니피그의 이가 건강한지 알아보는 방법:


*기니피그가 음식을 잘 먹는지 확인하세요.

* 앞니들이 삐뚤삐뚤 안하고 평평한지 한번 확인해 보세요.

* 1주일 마다 기니피그 몸무게를 검사하시고 만약에 줄었으면 기니피그 이가 부정교합 같은 이상한 점이 있는지 검사 해보세요.

기니피그의 이에 이상이 있을 경우 집에서 치료하는 방법은 없으니까 꼭 수의사한테 가서서 검사를 받으셔야 되요.

부정교합에 대해서 (malocclusion)



사진출처: The Guinea Pig Handbook

기니피그의 앞니들, 아니면 어금니들이 올바르게 안자라는걸 부정교합이라고 해요 (malocclusion). 보통 기니피그들은 앞니들만 자라는데 어떤 경우는 어금니도 자라는 경우도 있어요. 부정교합이 될 경우 흔한경우 아래 어금니가 기니피그의 혀쪽으로 자라게 되고 위에 앞니는 기니피그의 뺨쪽으로 자라게 되요, 그렇게 되면 기니피그가 음식을 먹으면서 아파하고 심하면 입안에 상처가 생겨서 더이상 기니피그가 음식을 못먹게 되요. (자료출처: Academy of Veterinary Dentistry, GuineaLynx)

부정교합 증상

- * 기니피그가 음식을 먹을때 귀가 좀 심하게 많이 움직이나요?
- * 건초같은걸 먹을때 한쪽으로만 씹어서 먹나요?
- * 기니피그 앞니들이 삐뚤삐뚤 안하고 반듯하게 생겼나요?
- * 음식에 대한 관심이 많은데 잘 안먹나요?
- * 점점 몸무게가 줄어드나요?
- * 침을 많이 흘리나요?

치료법:

키우는 기니피그가 부정교합일 가능성이 있을경우 수의사를 찾아가 주세요.

제가 키우는 기니피그중 모모도 부정교합 때문에 병원에 간적이 있어요. 거기에서 수의사 선생님이 모모 앞니하고 어금니를 검사하시고 치료 해주셨어요. 하지만 그 한번이면 끝나는게 아니라 1개월에 한번정도는 병원에 계속 다녀야 된대네요.

가격: 미국 같은 경우는 (제가 사는 동네) 앞니을 잘르는데는 한 \$15 정도 받으셨고 앞니와 어금니를 다 치료하는데는 합해서

\$30 받으셨어요, 물론 진찰비는 따로 받고요. 아마 한국은 좀더 가격이 쌀거라고 생각해요. (한국에서 기니피그 부정교합 치료하신 분 가격이 얼마정도인지 댓글에다가 가르쳐 주세요. ^^)

NOTE: 기니피그의 부정교합은 어떤경우 유전일 경우도 있어요. 부정교합을 가진 기니피그는 되도록이면 번식을 하면 안되요.

08.29
2008

기니피그 질병: 링웜

링웜은 피부병 이름인데 사람한테도 옮길수 있는 피부병이에요. 아주아주 무서운건 아니고 사람한테는 무좀이라고 할수 있는 병인데 기니피그한테는 좀 나쁜 (!!!) 병이에요.

일단 기니피그가 링웜이 있다면 의사한테 가는게 제일로 좋은 방법이에요. 괜히 집에서 혼자서 치료한다고 하면 기니피그한테 더 안좋아 질수도 있어요.

링웜이 생기는 이유는 다양한데 일단 습한곳에 있으면 링웜 걸릴수도 있고 또 다른 기니피그한테 옮았을수도 있어요.또한 스트레스, 식생활, 너무 좁은 케이지에서 많으 기니피그들하고 생활, 등등... 이유가 아주 다양해요.

빅토리아는 워낙에 급수기 바로 밑에 누워있는걸 좋아해서 링웜이 생겼고 (급수기 물이 똑똑 떨어져서) 모모는 다른곳에서 옮았고 세바스찬은 모모한테서 옮았어요. (-_;;;) 매일매일 하루에 한번씩 2주일동안 3마리 다 약 발라주는게 너무나도 힘들었어요. ππ 물론 지금은 3마리 다 괜찮아요.



링웜은 이렇게 기니피그 몸에 동그랴게 털이 빠져 있어요. 치료를 안하면 점점 더 다른곳으로 번지고 기니피그들이 많이 괴로워해요.

링웁 사진들은 참고하시고 싶으시면 여기에 사진들이 많이 있어요.

<http://www.guinealynx.info/fungus.html>



이 약은 제가 기니피그들한테 쓴 약이에요. 수의사 선생님이 주신 약인데 이약을 2주동안 발랐더니 기니피그들 링웁이 없어졌어요.

.....

링웁 치료하는 방법을 미국 기니피그 사이트에서 찾아보니까 상당히 많더라고요.

샴푸:

- Nizoral (니조랄): 기생성 피부질환용제로, 케토코나졸 2% 함유
- Malaseb (말라셉): 중요 성분들은 Chlorhexidine Gluconate 2%, Miconazole Nitrate 2% (miconazole Nitrate 은 제 기니피그가 링웁 걸렸을때 쓰던 약에 들어있었던 성분이었어요)

크림:

- Miconazole cream (이 약은 고양이 피부병 고칠때 쓰는거라도 들었는데 희석해서 기니피그도 쓰는 모양입니다), (Monistat 7, Femizol-M □ human OTC med): 중요 성분들은 miconazole nitrate 2%
- Clotrimazole (클로트리마졸, 이건 공팡이 균 때문에 생긴 피부병에 치료되는 약인데 도움이 되는 약인가 봅니다), (Gyne-Lotrimin, Mycelex, Lotrimin, Lotrisone): 중요 성분은 clotrimazole 1%

08.29
2008

기니피그 질병: 설사

기니피그가 설사를 하는 이유는 물기가 많은 간식을 먹었거나, 스트레스, 아니면 박테리아 (example: 살모넬라) 때문에 생기는 거예요. 기니피그가 설사를 하면 일단 물기 많은 간식은 설사가 멈출때까지 주지 마세요. 계속 펠렛과 건초하고 깨끗한 물을 주세요.



만약에 설사가 안멈추면 Probiotic (프로 바이오텍) 이라고 설사약이 있는데 이 약을 주셔도 괜찮아요. 이 사진에 있는 약은 아마도 펫마트에서 많이 파는 약일거예요. (미국이면 "Dr. Foster" 를 추천, 한국이면 제이펍을 추천합니다)

세바스찬이 이번 4월달에 설사때문에 병원에 갔는데 의사선생님이 Probiotic 약을 처방해 주시더라고요. 물론 1주일만에 괜찮아졌어요.

만약에 그래도 기니피그가 설사를 계속 하면 수의사한테 가는게 제일로 좋은 방법이에요.

* 기니피그가 설사를 하면 기니피그가 아주 많이 아픈거예요. 그렇기 때문에 되도록이면 기니피그가 설사를 하는걸 보면 빨리 고쳐주는게 좋아요.

* 궁금한게 있으시면 댓글에다가 궁금한걸 물어보셔도 되고요, 메일주소를 남기셔도 되요.

기니피그 요로감염증 (Urinary tract infection, UTI)

요로감염증에 걸렸을때 보이는 흔한 증상들:

- * 소변에 섞여있는 피.
- * 소변을 볼때 소리를 내면서 본다 (아플때 내는 소리).

소변에 피가 섞여있으면 소변이 마를때 빨간색으로 마르거나 아니면 핑크빛이 도는 색으로 마르게 되어 있어요. 보통 기니피그 소변이 마를때는 좀 갈색빛이 나는 색으로 마르고요.

요로감염증이랑 증상이 비슷한 질병들:

- * 자궁축농증
- * 결석 (결석에 관한 글: 통하기 신청하면 볼수가 있어요. <http://blog.daum.net/kellysworld/7838825>)
- * 간질성방광염
- * 관절염, 척추를 다쳤을때 (소변볼때 아프고 변을 받아 먹으려고 허리를 구부릴때 아프다).

진찰과 치료법:

먼저 수의사 선생님이 기니피그 엉덩이 부분을 잘 보신 다음에 결석을 의심 하시면 그때 x-ray 를 찍어서 자세히 검사하실 거예요. 또 다른 방법은 기니피그 소변 샘플을 받아서 소변 검사를 하실 거예요. 모든 검사를 마친 다음에는 그에 맞는 약을 처방해 주실 거고요.

요로감염증은 bactrim 같이 안전한 약을 수의사 선생님이 많이 처방해 주고 있어요. 보통 2-3 주 동안 약을 먹어야 되요. 만약에 약을 먹는 동안 괜찮았지만 약을 중단한 동시에 다시 아픈 증상이 보이면 약이 안 통했거나 아니면 다른 비슷한 증상인 다른 병에 걸렸을 확률이 꽤나 높으니까 즉시 수의사에게 연락을 하셔서 다시 검사를 받으셔야 되요. 만약에 수의사 선생님이 약을 처방해 주셨지만 x-ray 를 안 찍으셨으면 (결석이 의심 되시면) 꼭 찍어 달라고 하시면 되요.

요로감염증 예방 방법:

- * 젖어 있는 베딩은 꼭 갈아 주세요.
- * 털이 긴 기니피그는 (장모종) 청결을 위해 엉덩이 부분 털을 짧게 자르시면 좋아요.
- * 배변판이 있는 케이지를 쓰시면 (소변과 대변이 밑으로 빠져나가는 케이지) 요로감염증이 예방이 된다고 해요.

기니피그 몸안에 결석은 기니피그 방광 안에서 단단한 돌처럼 만들어 저요. 방광이 만들어 지는 이유는 모래와 같은 물질들이 방광 안에 점점 쌓여서 생기는 거예요. 가끔씩 결석이 기니피그 콩팥안이나 수뇨관 안에서 발견되는 경우가 있지만 그런 경우는 흔하지 않고 또 치료도 거의 불가능 해요.

결석이 기니피그 몸안에 계속 있으면 나중에 기니피그가 소변을 볼때 소변보는곳이 점점 결석때문에 막혀지고 그로인해 많이 힘들어 저요. 특히 수컷이 암컷보다 소변 보는 곳이 좁기 때문에 더 힘들다고 해요.



기니피그 몸안에 들어있었던 결석이에요.
이 결석의 크기는 약 2cm 정도 되네요.

기니피그 몸안에 결석이 있을때 나타나는 증상:

- * 기니피그가 본 소변 안에 피가 섞여져 있다.
- * 기니피그가 소변 볼때 소리를 내면서 소변을 본다.
- * 기니피그가 변을 받아 먹을때 소리를 내다.

기니피그 소변 안에 있는 피는 잘 안보일수도 있지만 수의사 선생님이 기니피그 소변을 검사할때 소변 샘플을 가지고 피가 있는지 알수가 있어요. 참고로 기니피그 소변에 피가 섞여 있는 다른 경우는 UTI (요로감염증) 때문일수도 있어요.

만약에 기니피그가 결석때문에 소변을 못보게 된다면 아주 심각한 상황이에요, 그러니까 되도록이면 증상이 보이자 마자 수의사를 찾아가시는게 제일로 좋은 방법이에요.

진찰과 치료법:

x-ray 나 초음파를 통해서 기니피그 몸안에, 그리고 몸안 어디에 결석이 있는지 알수가 있어요. 경험이 많은 수의사 선생님은 기니피그 몸안에 결석을 수술로 빼낼수가 있어요. 만약에 결석이 작으면 기니피그가 약을 먹어서 결석을 수술없이 빼는 경우도

있어요.

가끔씩은 암컷 기니피그일 경우, 그리고 결석이 작을 경우는 수의사 선생님이 암컷 기니피그의 생식기를 통해서 결석을 빼는 경우도 있어요. 물론 이 방법도 x-ray 를 통해 결석이 어디에 있는지 본 다음에 하는 방법이에요.

결석을 기니피그 몸안에서 꺼냈다고 다 끝난게 아니고 몇일 동안은 감염을 예방해야 되기 때문에 약을 먹어야 되요.

가끔씩 기니피그 몸안에 결석을 빼었지만 또 생기는 경우가 있어요.

기니피그 결석을 예방하는 방법:

아직까지는 기니피그 몸안에 결석이 생기는 정확한 이유는 없어요, 하지만 가끔씩 유전에 의해서 생기는 경우가 있더라고요. 아빠나 엄마 기니피그가 결석이 있었던 기니피그면 그 아기 기니피그도 결석이 걸릴 확률이 높아요.

결석을 예방하는 아주 좋은 방법은 바로 기니피그 음식에 답이 있어요. 칼슘이 많은 음식을 많이 먹을 경우 결석이 나타나는 확률이 꽤나 높아요. 알파파 건초에는 칼슘이 많이 들어있기 때문에 어린 기니피그나 임신한 기니피그에게는 좋지만 성인 기니피그 (태어난지 5~6개월 후) 는 티모시 건초를 먹는게 제일로 좋아요.



기니피그에게 당뇨병이란

American Diabetes Association 에서는 당뇨병을 몸 안에서 인슐린을 제대로 공급을 하거나 제대로 사용을 못해서 생긴 병이라고 해요. 인슐린 (insulin) 은 몸 안에 있는 호르몬 중 설탕, 전분, 그리고 다른 여러 음식을 몸 안에 필요한 에너지로 변화시키는 거예요.

두가지 종류의 기니피그 당뇨병이 있다고 해요:

- 1) 첫번째 종류의 당뇨병은 기니피그가 아주 어렸을때부터 생기는 건데 (보통 1살되기 전에) 당뇨병이 생기는 이유는 기니피그 몸이 아예 인슐린을 공급을 못해서 그래요. 이런 종류의 당뇨병은 항상 인슐린을 주셔야 되요.
- 2) 두번째 종류의 당뇨병은 신진대사의 기능이 떨어져서 생기는건데 기니피그가 몸 안에 있는 인슐린을 제대로 공급을 못하거나 아니면 제대로 못써서 생기는 거예요. 2번째는 보통 어른 기니피그에게 생기는 병이에요. 조사에 의하면 보통은 기니피그가 당뇨병에 걸리면 2번째 당뇨병에 많이 걸린다네요.

기니피그가 당뇨병에 걸렸을때 보이는 증상

- * 기니피그 눈이 밝지않고 흐릿하게 보인다.
- * 기니피그 엉덩이가 자주 젖어있다.
- * 요로 감염 (Urinary tract infection, UTI) 에 자주 걸린다.
- * 물을 너무 자주, 많이 마신다.
- * 소변 양이 너무 많다.

* 음식을 아주 잘 먹는데 몸무게가 점점 빠진다.

이 모든 증상이 보이는게 아니라 한가지 아니면 두가지의 증상이 보이면 한번 수의사한테 기니피그 몸을 검사해 달라고 하세요.

치료법

당뇨병 종류 1: 인슐린이 항상 필요한 기니피그이기 때문에 꼭 인슐린 주사를 맞아야 되요. 수의사랑 먼저 상의를 한 다음에 인슐린 양에 대해서 자세히 알고 기니피그에게 주사를 놓는법을 배운다음에 혼자서 직접 주사를 놓을수도 있대요.

당뇨병 종류 2: 이런 경우는 주사를 놓아도 되지만 보통 먹는 약으로 해결이 되는 경우도 있어요. 캐나다에서 이 약의 이름은 "glyburide" 이고 미국에서는 이 약을 "glipizide" 라고 해요. 이 약은 수의사를 통해서 얻을수가 있어요.

당뇨병 걸린 기니피그 음식

* 간식은 주실때 간식에는 절대로 설탕이 들어가면 안되요 (예를 들어서 팻삽에서 파는 기니피그 간식종류들). 과일에도 설탕이 첨가되어 있는데 과일을 주실때는 아주 조금씩 주시면 되요.

* 기름기가 많은 음식도 금지, 예를 들어서 씨앗하고 옥수수 말린것들.

* 섬유질이 많은 건초양을 늘려야 되요. 티모시 건초는 섬유질이 많이 때문에 기니피그에게 아주 중요한 역할을 하고 있어요. 기니피그 펠렛을 주실때는 알파파 건초를 만든 펠렛이 아니고 티모시 건초로 만든 펠렛을 주시면 되요.



만약에 기니피그가 음식을 안먹으면 즉시 수의사를 찾아가 주세요.

기니피그가 음식을 안먹으면 병에 걸려있을 확률이 높으니까 수의사를 찾아가셔서 기니피그 몸 건강 검사를 받아야 되요.

또한 기니피그가 음식을 안먹어서 몸무게가 많이 줄어있는 상태면 더욱더 상태가 심각해 지기 때문에 되도록이면 빨리 기니피그를 보는 수의사를 찾아가셔서 기니피그 몸 건강 상태를 봐야되요. 먼저 기니피그가 음식을 안먹으면 영양분을 섭취 못하고, 몸안에 있는 비타민 C도 많이 없어지기 때문이에요.

기니피그가 음식을 안먹는 여러가지 이유

- * 항상 먹는 음식이 바졌을때
- * 주의 온도가 너무 심하게 자주 바뀔때
- * 독에 중독
- * 물 부족
- * 케이지안에서 같이 생활한 다른 기니피그가 세상을 떠났을때
(<http://blog.daum.net/kellysworld/7426716>)
- * 다른 성격나쁜 기니피그가 음식을 먹는데 방해할때 (왕따)
- * 부정교합 (기니피그 덧니, 기니피그 이가 너무 많이 자랐을때)

- * 아플때
- * 냄새를 못맡을때 (코에 이상)
- * 비만
- * 입안이 어떤 문제때문에 상처가 났을때
- * 질병에 감염 (예를 들어서 폐렴같은 병)
- * 비타민 C 부족
- * 가끔씩 약 부작용에 의해서 음식을 못먹는 경우 (<http://blog.daum.net/kellysworld/7838803>)



기니피그에게 안전하고 탈이 없는 약을 처방해서 준다고 해도 (Baytril 같은 약) 가끔씩 기니피그가 입맛이 떨어져서 음식을 안먹기도 해요. 또는 약에 부작용 증상이 있으면 설사할수도 있고, 아니면 기니피그가 활발하지 못하고 무기력 상태가 되요.

만약에 키우는 기니피그가 안전하고 수의사가 처방해준 약을 먹었는데 이런 증상을 보이면 즉시 다른 약을 처방해 달라고 하세요. 기니피그가 계속 몸에 안맞는 약을 먹게 되면 더욱더 심각한 증상이 나타날수도 있어요.

기니피그 약 부작용이 생기는 이유

아무리 기니피그에게 안전한 약이라고 해도 그에 맞는 약을 잘못 처방해 주는 경우도 있기 때문에 항상 수의사 선생님이 약을 처방하실때 기니피그가 걸린 병 (박테리아 샘플) 을 자세히 알고 그에 맞는 약을 처방해야 되요.

기니피그는 병에 걸릴때 한 종류의 박테리아에 의해 감염되어서 병에 걸리는게 아니라 가끔은 여러 종류들의 박테리아에 감염될 수도 있기 때문에 기니피그에게 약을 처방할때는 항상 박테리아의 정체를 먼저 밝혀야 되요.

하지만 가끔씩은 박테리아 검사할 시간이 없으면 (예를 들어서 아주 급하게 치료해야할 병이라면) 그냥 증상만 보고 약을 처방하는 경우가 있기 때문에 기니피그가 그 약에 대한 부작용이 생길수도 있어요.

기니피그에게 맞는 약이면 보통 2~3일 사이에 기니피그 병이 많이 좋아지는걸 보실수가 있어요. 기니피그에게 처방해준 약은 기니피그 상태를 좋게 해야지 절대로 나빠지게 만들면 안되요.

12.27
2008

기니피그 질병: 소변으로 인한 열탕상

소변으로 인한 열탕상: 아픈 기니피그에게 가끔씩 걸리는 피부병이에요.

이 피부병이 생기는 이유는:

- * 요도감염
- * 방광결석
- * 간질성방광염
- * 자궁축농증

또 열탕상이 일어나는 다른 이유는 다쳐서일수도 있고 나이가 많이 들어서 더이상 움직일수가 없을때예요.

아마 토끼한테도 이런 비슷한 질병이 있다고 들었어요.



소변으로 인한 열탕상에 걸린 기니피그의 피부모습 (너무 아파 보여요...ㅠㅠ)

치료법

천천히 단계를 거쳐서 하면 금방 쉽게 치료할수 있어요.

아기들이 기저귀 발진때 쓰는 약이 기니피그가 걸린 소변으로 인한 열탕상을 없애는데 아주 효과가 좋아요.

- 1) 피부병에 (열탕상) 걸린 부분을 깨끗하고 따뜻한 물에다가 씻겨주세요.
- 2) 소독약을 물이랑 1대40으로 희석해서 피부병에 노출된 부위를 소독해 주세요.

* 소독약 종류 (1): Chlorhexidine Gluconate 2% (클로르헥시딘)

* 소독약 종류 (2): Povidone Iodine: 한국에서도 이름이 많이 알려져 있는 소독약인 포비돈이예요. 역시 이 소독약을 쓰실때 1대40으로 희석해서 쓰세요.

3)소독한 부위를 잘 건조시켜 주세요.

4) 기저귀 발진때 쓰는 약 (기저귀 발진 크림), 예를 들어서 desitin (데시틴), Balmex, Desinex, 을 기니피그가 먹지 않게 피부병(열탕상) 걸린부분에다가 바르세요.

12.18 기니피그의 눈에 관해서

2008

기니피그는 아파도 주인에게 "나 아파요" 라고 말할수도 없고 또 아프다고 계속 울면서 신호를 주지도 않아요. 이번에는 기니피그 눈을 통해서 기니피그가 아픈지, 아니면 건강한지를 알아보는 시간을 가지겠습니다.

기니피그의 눈에 관해서



건강한 기니피그의 눈은 맑아요. 기니피그는 눈이 약간 튀어나왔고 양쪽 다 똑같은 사이즈예요. 기니피그는 잘때도 눈을 뜨고 자는 경우가 많지만 또 어떤 경우에는 눈을 감도 자기도 한답니다. 또 신기한 점은 기니피그의 눈 시력은 엄청 나쁘지만 색깔을 구분할수 있다고 해요.

기니피그의 눈 색깔

기니피그들의 눈은 여러 색깔들로 나누어져 있어요. 브리더들은 눈 색을 짙은 색, 짙은 루비색, 그리고 핑크로 구분한답니다. 짙은 눈 색에는 갈색, 검정색, 그리고 파란색이 있다고 하네요. 건강한 기니피그의 눈은 밝은 불빛에는 빨간색을 반사시켜요. (예: 플래쉬라이트를 기니피그의 눈에 비추어 보면 검은 눈이 빨간색으로 반짝 반사시키는 거죠)

기니피그의 눈에서 나오는 하얀색의 액체



기니피그들은 가끔씩 하얀색의 액체를 눈에서 나오게 하는데
그 액체를 통해서 기니피그들은 얼굴을 깨끗하게 그루밍을 해요.
기니피그는 먼저 눈에서 하얀 액체가 나오면 앞발을 들어서 세수하는 행동을 해요.
그러니까 기니피그의 눈에서 하얀 액체가 나오면 기니피그가 "나 세수할거예요" 라는 거니까
걱정 안하셔도 되요.

이상이 있을때

기니피그의 눈에 이런 이상한 경우가 보이면 수의사한테 찾아가주세요.

- * 매끈매끈 안하고 윤기가 없는 눈
- * 물기가 너무 많은 눈 (눈물이 나온대거나 눈에서 눈물같은게 너무 많이 고여있을때)
- * 흐릿한 눈
- * 눈 색이 옅어졌을때
- * 너무 많이 튀어나온 눈
- * 눈에 흑같은게 생겼을때

기니피그의 눈에서 이런 이상이 보이는 이유는:

- * 호흡기관 문제 (자세한건 <http://blog.daum.net/kellysworld/7696748>)
- * 다쳤을때
- * 농양, 종기

- * 이빨에 무슨 문제가 있을때
- * 건조 (탈수증), 아플때
- * 백내장
- * 당뇨병

기니피그의 눈에 이상이 있을 경우 수의사를 찾아가는걸 뒤로 미루지 마세요. 기니피그의 건강에 아주 큰 문제일수도 있어요.

기니피그의 결막에(눈) 이상이 있는 경우



이런 눈을 Pea Eye (fatty eye) 라고 하는데 지방이 기니피그의 결막에 쌓여서 그래요.

기니피그가 보는데 방해가 된다고 생각하면 동물병원에서 레이저로 간단히 제거할수가 있어요.

하지만 기니피그가 보는데 Pea Eye 가 방해가 안된다면 꼭 없애지 않아요 되요.

(사진출처: *The Guinea Pig Handbook*)

11.04 기니피그 털 관리의 기초

2010

경험담~ 입니다

제가 처음 세바스찬을 키웠을때 기니피그에 대해 처음으로 놀랐던 기억이 바로 세바스찬의 털 빠짐이었어요. 기니피그를 처음 키울때는 놀랄일이 많았던거 같아요. ^-^

하루는 세바스찬이 설사를 해서 처음으로 동물병원에 데리고 갔는데 세바스찬의 털이 우수수 하고 빠져서 어찌나 놀랐던지 (피부병인 줄 알았대지요). 다행히도 수의사 선생님이 옆에 계셔서 세바스찬의 털 빠짐에 대해 물어보니 단순히 스트레스 때문에 빠진거라네요. (사람이랑 많이 비슷하다고 느꼈답니다, 저도 스트레스 받으면 머리카락이 우수수 하고 빠져서요 ㅎㅎ)



털 빠짐에 대해서 정확하게 알아보면 걱정이 사라지는 느낌

기니피그의 털 갈이에 대해서

기니피그는 털갈이를 자주 하는 편이라고들 하지만, 이런 경우도 case by case 라고 하네요. 밖에서 사는 기니피그의 경우 (여름에는 여름을 느끼고 겨울에는 겨울을 느끼는 곳, 베란다 같은 곳이라고 생각하시면 되요) 봄과 여름에는 털의 두께가 얇아지고 가을과 겨울에는 털의 두께가 두꺼워 진다고 하네요. 계절의 바뀔에 따라 (즉 온도의 차이) 기니피그가 털 갈이를 한다고 생각하시면 될거 같아요.

기니피그를 집 안에서 키울경우 (집안 온도가 1년 내내 비슷하거나 똑같은 경우) 기니피그는 1년 내내 털갈이를 한답니다. 그래서 매일 기니

피그 케이지 청소를 할때 기니피그 털이 자주 보이는 이유를 알거 같지요.

임신한 기니피그 같은 경우에도 임신 마지막 기간, 그리고 아기 기니피그들 에게 젖을 먹이는 기간동안 가슴털과 배 부분털이 좀 많이 빠지는 편이에요.



피부가 보일정도로 털이 빠질 경우

기니피그는 스트레스를 받으면 털이 좀 많이 빠지는 편이에요. 털이 빠지는걸 눈으로도 직접 볼수가 있으니까요. 하지만, 기니피그의 털이 기니피그의 피부가 보일정도로 많이 빠진다는건 피부와 몸에 어떤 이상이 있다는 증거예요.

* 링웍 - 동그랗게 털이 빠지면서 점점 그 크기가 커지는 곰팡이성 피부병 입니다. 참고로 기니피그의 귀 뒤는 원래 털이 없고, 가끔씩 그루밍에 의해 앞발에 털이 없는 경우도 있습니다.

(링웍에 관한 글 클릭)<http://blog.daum.net/kellysworld/6431971>

* 기생충, 벌레 - 기니피그가 엄청 가려워 하고, 털도 많이 빠지고, 기생충과 벌레에 따라 심하면 죽음으로 갈수도 있습니다.

(기생충에 관한 글 클릭)<http://blog.daum.net/kellysworld/7838776>

* 개선충 - 기니피그의 몸을 만지면 매우 아파하고 빨리 치료하지 않으면 위험해요.

(개선충에 관한 글 클릭)<http://blog.daum.net/kellysworld/7838874>

* 열탕상 - 엉덩이 부분의 털이 없어요.

(열탕상에 관한 글 클릭)<http://blog.daum.net/kellysworld/7838785>

* 그 외 다른 질병 - 꼭 피부병 뿐만 아니라 기니피그의 몸에 영양분이 부족할 경우, 그리고 몸안에 다른 질병에 의해 털이 많이 빠질수도 있어요.

TIP

기니피그의 털이 많이 빠진다고 생각이 들면 즉시 기니피그의 피부를 잘 관찰해 주세요. 기생충에 따라 틀리지만 어떤 기생충과 벌레의 경우에는 사람 눈에도 먼지크기로 보이는 경우가 있습니다.

만약에 기니피그의 털이 생각보다 많이 빠지는데 피부병이나 다른 기생충이 아니라면 그때는 포비돈 (빨간약) 을 기니피그가 목욕하는 물에다가 몇방울 섞은다음에 기니피그 목욕을 시켜주면 털 빠짐이 한결 괜찮아 진답니다.

기니피그 털을 자주 브러쉬를 해주면 (부드러운 소동물 전용 브러쉬가 아프지 않고 좋아요) 기니피그의 몸에 붙어있는 죽은 털들을 말끔하게 제거할수 있습니다. 물론 기니피그 털을 브러쉬 해주면 주인과 기니피그의 관계가 더욱더 가까워 져서 1석 2조 랍니다. ^^

기니피그한테 기생하는 기생충 잡기

먼저 기니피그에게 기생하는 기생충에 대해서 알아봅시다.

기니피그에게는 여러가지 기생충들이 살수가 있는데 그 중 진드기에 대해서 설명할게요.

기니피그에게서 기생하는 벌레중 *Gliricola porcelli* 하고 *Gyropus ovalis* 가 있어요. 그 중 *Gliricola porcelli* 는 사람 눈으로도 보여요. 흐린 노란색이고 작은 먼지같이 생겼는데 잘 보면 꼬불꼬불 움직인답니다.

이 기생충들은 기니피그에게 기생하면서 생활하고 있어요. 기니피그가 감염되는 이유는 감염된 기니피그의 배당, 용품, 감염된 기니피그를 만지고 다른 기니피그를 만졌을때 등등... 이유가 아주 다양해요.

동물병원에 가면 의사선생님이 약을 처방해 주실거예요. Advantage (imidacloprid) 라는 약인데 아주 안전하고 기니피그들에게 잘 통하는 약이에요. 또 다른 방법은 모모가 역시 기생충에 의해 피부병에 걸렸을때 주사로 맞은 약인데 Ivermectin 이라고 잘못 처방하면 기니피그를 죽음으로 가게 만들수도 있어요.

Advantage 라던지 Ivermectin 은 수의사를 통해서 구할수 밖에 없지만 중요한건 양을 잘못 계산하면 기생충은 뭐고 기니피그도 죽을 수 있으니까 꼭 기니피그를 치료한 경험이 많은 수의사를 찾아가는게 제일로 중요해요.

만약에 수의사에게 가기 싫으시면 제 경험담을 한번 읽어 보세요.

2틀전에 제가 빅토리아의 털을 손질해 주고 있었는데 아주아주 작은 노랑고 먼지 같은게 빅토리아의 털에서 기어다니고 있는거예요!!! 바로 *Gliricola porcelli* 라는 기생충이었어요.

얼나마 놀랐던지... 마음속으로 꺾에에에에에에에엑!!! 이라고 소리쳤답니다.
기니피그 기생충을 전멸시킬 준비를 2틀에 걸쳐서 여러 정보들을 찾고 드디어 오늘 기생충퇴치 계획을 세웠답니다.



준비물: Flea & Tick 스프레이, 알코올 (70%), 수술용 장갑, 마스크, flea comb (동물 벼룩 잡을때 쓰는 빗), 큰 양동이 2개, 소금, 빨래
용 세제

참고로 flea comb 는 금속으로 만들어 진걸 쓰셔야 되요.
플라스틱으로 만들어진건 기생충들이 잘 안잡혀요.

먼저~ 기니피그 용품들 소독하기



먼저 준비한 양동이에다가 빨래세제를 뿌리고 따뜻한 물을 짹 채워주세요.



그런 다음엔 기니피그가 쓰는 빨수 있는 용품들을 좀 오랫동안 담가주세요. 나중에 어느정도 소독이 되었다 싶으면 세탁기에다가 넣고 빨아주시고 햇빛에다가 널어주세요.



다른 양동이에는 따뜻한 소금물을 만들어서 기니피그가 쓰는 그릇, 건초렉, 장난감 등등을 담가주세요. 이것도 어느정도 소독이 되었다 싶으시면 깨끗한 물에다가 소금기를 빼고 물기를 닦아주세요.



기니피그 케이지는 알코올을 써서 깨끗하게 소독시켜 주세요.

Flea & Tick 스프레이 쓰는 방법~



이 스프레이는 잘 쓰면 아무 문제도 없지만 잘 못쓰면 아주 위험해요.
일단 사람 눈에 들어가거나, 손에 묻거나, 입에 들어가면 위험하니까
마스크 쓰시고, 수술용 장갑 끼시고 사용하셔야 되요.

먼저 기니피그를 이 스프레이를 써서 몸 전체에다가 구석구석 뿌려주세요. 먼저 엉덩이 부분부터 시작한 다음에 점점 위에 부분을 뿌려
주세요. 참고로 얼굴 부분은 절대로 뿌리지 마세요.

얼굴 부분만 빼고 기니피그 몸 전체가 약품으로 목욕한것처럼 축축해 졌으면 몸이 마를때까지
기니피그가 그루밍을 못하게 수건으로 잘 감싸주세요.

기니피그 몸이 다 마르기 전까지는 케이지 안에 넣어주시면 안되요.
그 이유는 약품이 덜 말랐을때 기니피그가 그루밍을 하면 약품이 입안에 들어갈수도 있거든요.
다 말르면 그때부터 그루밍 해도 괜찮아요.

기니피그 몸에서 약품이 다 없어졌으면 이젠 준비한 flea comb 으로 잘 빗겨주세요.
빗기시다 보면 빗에 죽어있는 기생충들이 걸려 나오는데 보이실 거예요.

저도 빅토리아 몸에서 기생충이 한 20마리 정도 나왔어요. (다 죽어서 나오니까 걱정하지 마세요)

Flea comb 를 다 쓰셨으면 알코올로 소독해 주세요.

하지만 이게 다가 아니고 1주일에 한번씩 3번정도 이렇게 해주셔야 되요. 그 이유는 벼룩이건, 기생충이건... 이녀석들은 죽었다 해도 이 녀석들의 알도 그 수가 상당히 많거든요.
아무리 스프레이를 쓴다 해도
기생충 알까지 퇴치되는게 아니라서 할수없이 다 못죽인다고 해도
cycle (주기) 를 맞춰주셔서 약을 뿌려주셔야 되요.

09.17
2010

기니피그 상태 파악하기: 임신 vs. 배에 살이 찼을때 vs. 가스

기니피그의 임신증상은 암컷 기니피그의 배가 볼록하게 커진다는 거지만 (물론 다른 증상들도 많답니다), 배가 볼록해 졌다고 해서 임신이라고 생각하시기 전에 먼저 몇가지 증상들을 체크한 다음에 증상들에 대한 결정을 내리는게 중요합니다.

가끔씩 기니피그의 배에 가스가 찰 경우 기니피그의 배가 똥똥하게 보이는데, 그냥 놔두면 매우 위험하니 즉시 치료를 하여야 기니피그가 괜찮아 진답니다.

하지만, 기니피그를 키우는 초보일 경우에는 기니피그의 배가 불러왔을때 임신인지, 배에 살이 찌서 그런지, 아니면 가스때문인지에 대해 구분을 하는게 상당히 어려울거예요.

하지만, 몇가지 기니피그 임신에 대한거와, 기니피그 배에 가스가 찼을때 나타나는 증상에 대해 알고나면 구분하기가 생각보다 쉽답니다.

기니피그 임신:



여기 옆에 사진에 나와있듯이, 암컷 기니피그가 임신을 하면 이렇게 배가 볼록해 진답니다. 처음에는 배가 작다가 점점 날짜가 갈수록 배가 볼록볼록 커지는걸 볼수가 있을거예요.

암컷 기니피그가 임신을 하고 어느정도 배가 불러왔을때 배를 살짝 만져보면 태동이 느껴진답니다.

임신한 기니피그의 배 크기는 배안에 몇마리의 기니피그가 들어있냐에 따라 틀리답니다. 참고로, 여기 사진에 나와있는 임신한 기니피그는 나중에 아기 기니피그를 세 마리 낳았답니다. ^^

임신에 관한 질문에 대한 댓글:

<http://blog.daum.net/kellysworld/7838757>

임신뿐만 아니라 다른 이유로도 기니피그의 배가 통통해 보일수도 있습니다.

바로 밑에 경우에는 기니피그가 살이 찼을때입니다. 기니피그가 살이 찌는건 비만으로 갈수도 있기 때문에 항상 조심을 해야되지만, 갑자기 몸무게가 빠지는 것도 항상 조심해야 된다고 생각이 듭니다 (갑자기 몸무게가 빠지는 이유는 질병에 관한게 많기 때문에 항상 기니피그의 몸무게를 시간내서 체크해 주세요).

살이 찢을때:

기니피그는 음식을 먹으면 살이 찢는데, 특히 살이 많이 붙은 기니피그는 배부분이 볼록하게 나오더라고요. 살이 찢을때 배가 나온거와 임신을 해서 배가 나온건 처음에는 비슷하게 보이지만 나중에 시간이 지나면 그 차이점이 뚜렷하게 나타난답니다. 살이 찢서 나온 배는 기본적으로 배를 만졌을때 태동이 느껴지지 않아요.

바로 밑에글을 기니피그의 배에 가스가 찼을때 나타나는 증상들인데 매우 위험한 상황 중 하나입니다. 기니피그 배에 가스가 심하게 찼 경우에는 기니피그의 생명에 위험이 가기 때문에 항상 기니피그에게 간식을 줄때 주의해 주세요 (간식의 양은 기니피그가 하루에 먹는 건초양의 10% 를 넘기면 안됩니다).

배에 가스가 찼을때:

기니피그 배안에 가스가 차면 많이 위험하답니다. 기니피그는 장이 매우 약하기 때문에 조금이라도 음식을 잘못 먹으면 배안에 가스가 쉽게 찼수가 있어요. 기니피그의 배 안에서 가스와 물이 쌓이면 점점 배가 부풀어 오르고 팽창하게 된답니다.

배에 가스가 찼다는 증거

- * 배를 살짝 통통 쳐 보면 빈소리가 난다.
- * 배를 살짝 눌르면 기니피그가 매우 아파한다.
- * 기니피그의 대변 모양이 매우 작다.
- * 기니피그가 음식을 안먹고 움직임도 거의 없다 (이 경우는 다른 질병과 증상이 비슷합니다).

치료법

배안에 가스가 찼을때 계속 방치해 두면 기니피그가 죽음으로 갈수도 있기 때문에 빨리 치료를 해야합니다.

배안에 가스가 찼을경우 심하지 않으면 집에서 손으로 기니피그의 배를 살살 문질러서 배안의 가스를 빼줄수가 있어요. 하지만, 매우 심할 경우에는 집에서 치료가 거의 불가능 하기 때문에 되도록이면 빨리 동물병원에 데리고 가서 치료를 받아야 합니다.

병원에 사정이 있어서 빨리 못가는 상황이라면 집에서 간단하게 치료를 한다음에 되도록이면 빨리 병원에 데리고 가 주세요.

* 사람 아기들이 먹는 simethicone (시메치콘) - 아기들 배에 가스가 찼을때 먹는 소화제 종류예요. 사람 아기가 먹는 양의 1/4 를 먹이시면 되요.

08.17 기니피그 노후에 대해서

2010

기니피그는 보통 5~8년 까지 살고 기네스북에 나온 세상에서 제일 오래 산 기니피그는 15년동안 살았다고 해요. 기니피그가 깨끗한 환경, 넉넉하고 영양이 잘 잡힌 음식들, 그리고 행복하게 살면 오래 살겠지만 기니피그가 살기에 적절하지 못한 환경에서 살면 오래 살지 못하겠죠. 하지만 건강한 기니피그도 나이가 들면 세상을 떠나게 되네요.

기니피그가 나이가 들면 주인의 손길이 더 많이 필요하답니다. 기니피그가 나이가 들면 여러가지 질병에 노출될 확율이 더욱 높아질 뿐만 아니라, 몸 여러군데 문제도 많이 생기기 때문에 주인이 많이 보살펴야 한답니다.



세바스찬이 인형들과 같이찍은 사진.

제가 키우는 기니피그들 중 나이가 제일로 많은 세바스찬,
세바스찬이 오랫동안 건강하고 행복하게 살았으면 좋겠어요.

기니피그가 늙어간다는 증상

- * 털에 윤기가 없어지고 털이 보통보다 많이 빠진다는게 느껴진다.
- * 몸이 많이 약해지면서 기생충과 여러 벌레에 감염이 되기 매우 쉽다.
- * 젊었을때와 달리 병에 걸리면 치료하기가 매우 힘들다.

- * 심장속도가 젊었을때와 달리 약간 빨라진다.
- * 눈동자가 많이 흐려진다 (하지만 기니피그가 그리 불편해 하지는 않는다고 해요).
- * 귀가 잘 들리지 않는다 (그로인해 나이가 들면 다른 기니피그와 소리로 소통을 잘 하지 않는다고 해요).
- * 움직임이 적어지고 누워있는 시간이 더 많아진다.

하지만, 기니피그가 나이가 들어서도 기억력은 떨어지지 않는다고 해요. 오히려 새로운걸 가르쳐 주면 그걸 나이가 젊은 기니피그보다 더 기억을 잘 한다고 하네요. 그리고 늙어가는 기니피그는 젊은 기니피그에 비해 아주 어린 기니피그와 친하게 지낼 확률도 매우 높다고 해요.

기니피그가 나이가 들면 여러가지 질병이 생길수도 있는데 그 중 확률적으로 제일로 많이 생기는 질병들이 있습니다.

매복증

기니피그에게 매복증이란 기니피그가 나이가 들면서 대변이 항문안에서 나오지를 못해서 항문안에 나오지 못하는 대변이 꼭 차있는거예요. 대변을 못보고 항문안에 잔뜩 끼 있느니 기니피그는 매우 고통스러울거예요, 그렇기 때문에 주인이 시간을 내서 자주 기니피그 항문 안에 끼 있는 대변을 꺼내주어야 해요.

치료법:

따뜻한 물로 적신 얇은헝겊으로 기니피그 항문을 적신다음에 쌓였던 대변이 어느정도 부드러워 졌으면 기니피그 항문에서 살살 쌓여있었던 대변을 빼주세요. 그런다음 항문에서 대변이 빠졌으면 항문 주변을 깨끗하게 닦아주세요. 그런 다음 수의사를 찾아가셔서 기니피그 항문 주변에 바를 약을 처방받는 방법도 좋아요. 그 이유는 기니피그 항문주변이 그동안 쌓였던 대변으로 의해 살짝 염증이 생겼을수도 있거든요.

치료법2:

매복증을 치료할수 있는 수술도 있다고 하네요. 기니피그에게 수술이 매우 위험하기 때문에 이 방법을 택하실 경우 꼭 기니피그 수술에 경험이 매우 많은 수의사를 찾아야 합니다.

열탕상 (소변으로 인한 피부병)

기니피그가 나이가 많아지면서 슬슬 움직임이 적어지고, 그로 인해서 소변을 볼때도 누워서 보는 경우도 많아진답니다. 배 부분과 항문 쪽이 소변으로 의해 젖게되고 그로인해 피부병이 생길수도 있어요. 하지만, 열탕상 같은 피부병일 경우에는 주인이 자주 관리를 해주면 생길 확률이 적어진답니다. 매일 기니피그의 몸을 따뜻한 물로 젖신 수건으로 잘 닦아주시면 되요.

치료법:

천천히 단계를 거쳐서 하면 금방 쉽게 치료할수 있어요.

아기들이 기저귀 발진때 쓰는 약이 기니피그가 걸린 소변으로 인한 열탕상을 없애는데 아주 효과가 좋아요.

- 1) 피부병에 (열탕상) 걸린 부분을 깨끗하고 따뜻한 물에다가 씻겨주세요.
- 2) 소독약을 물이랑 1대40으로 희석해서 피부병에 노출된 부위를 소독해 주세요.

* 소독약 종류 (1): Chlorhexidine Gluconate 2% (클로르헥시딘)

* 소독약 종류 (2): Povidone Iodine: 한국에서도 이름이 많이 알려져 있는 소독약인 포비돈이예요. 역시 이 소독약을 쓰실때 1대40으로 희석해서 쓰세요.

3)소독한 부위를 잘 건조시켜 주세요.

4) 기저귀 발진때 쓰는 약 (기저귀 발진 크림), 예를 들어서 desitin (데시틴), Balmex, Desinex, 을 기니피그가 먹지 않게 피부병(열탕상) 걸린부분에다가 바르세요.

01.15
2010

기니피그 대변을 통해서 기니피그의 건강 알기

기니피그가 건강한지, 아니면 아픈지를 알아내는 방법은 여러가지가 있어요. 눈을 통해 아는 방법도 있고, 털의 윤기를 통해서, 소변, 등등, 방법은 아주 다양해요. 그 중 오늘 전 기니피그의 대변을 통해서 기니피그가 건강한지에 대해 쓰기로 할게요.

기니피그의 위장, 즉 기니피그가 속이 불편하면 기니피그의 대변에 이상함이 즉각 보일거예요. 기니피그의 속이 불편한건 여러가지 이유가 있어요. 기생충, 박테리아 감염, 바이러스에 의해 감염, 적당하지 않는 음식 섭취, 스트레스, 지저분한 환경, 등등.



건강한 기니피그의 대변 모양은 이렇게 왼쪽 사진처럼 타원형에다가, 만지만 단단하지만 가루처럼 부서지지 않는, 검은색이나 갈색, 아니면 둘가지의 색이 섞여져 있는 거예요.

다른 건강한 기니피그의 대변 중, 모양은 왼쪽처럼 타원형인데, 초록색이면서 물컹한 대변은 영양가가 아주 풍부해서 기니피그가 다시먹는 변이에요. 설사는 아니니까 너무 걱정하지 마세요. ^^

기니피그의 속을 편하게 해줄려면 어떤 음식을 먹이느냐에 따라 많이 달라지는거 같아요.

기니피그에게 중요한 건초는 물론, 기니피그에게 알맞는 펠릿, 그리고 신선한 물, 적당한 양의 야채와 비타민 C 매일 보충.



펠렛은 기니피그에게 맞는 펠렛을 주시고, 매일매일 깨끗한 그릇에다가 새로운 펠렛을 담아주시는게 좋아요. 기니피그 한마리가 펠렛을 먹는 양은 하루에 2번씩 (아침, 저녁), 한주먹씩 주시면 딱 좋아요.

기니피그에게 좋은 펠렛에 관한 글은

<http://blog.daum.net/kellysworld/7838740>



기니피그 소변이 묻어있는 건초는 과감하게 쓰레기통으로~
 항상 신선한 건초를 건초렉에다가 자주자주 채워주세요.
 기니피그가 하루에 먹는 건초양은 무제한입니다.

그 외 물도 꼭 급수기 (물통) 에다가 주시면 위생상 좋을뿐만 아니라, 기니피그가 물을 마시기가 좀더 편해져요. 물은 매일매일 신선한 물로 갈아주시고, 물통도 항상 깨끗한지 확인을 하셔야 되요.

물통을 깨끗하게 닦은 방법은 밑에링크를 클릭해 주세요.

<http://blog.daum.net/kellysworld/7838926>

기니피그가 속이 불편한 여러가지 경우

배가 부어올랐을때 (배에 가스가 찼을때)

기니피그의 배 안에서 가스와 물이 쌓아지면 점점 배가 부풀어 오르고 팽창하게되요.

이유: 기니피그의 배에 가스가 차는 이유는 다양한데, 그 중 제일 흔한이유는 가스를 쉽게 일으키는 야채를 먹었다거나, 감염, 그리고 위장에 어떤 문제라고 볼수가 있다고 하네요.

치료법: 기니피그 배에 가스가 차면 기니피그는 아주 많이 아파하고, 계속 놔두면 죽음으로 갈수도 있어요. 그렇기 때문에 되도록이면 기니피그 배에 가스가 차면 재빨리 동물병원에 가시는게 제일로 좋아요. 아주 살짝 가스가 찼을 경우 집에서 기니피그 배를 가스가 나올때까지 살살 문질러 주면 되지만, 심하게 가스가 배안에 있어서 기니피그 배가 뽕뽕할 경우, 병원에 가는게 좋아요.

 변비 (변이 잘 안나오거나, 변 모양이 아주 작을때)

변비라면 많은 분들이 잘 아실거라고 생각이 들어요. 바로 대변이 잘 안나오는걸 이야기 하는 거지요. 기니피그의 경우 변비에 걸리면 대변도 잘 안나오고, 대변의 모양도 아주 작을뿐만 아니라 너무 건조해서 부스러지는 경우가 많아요.

이유: 기니피그가 변비에 걸리는 이유는 몸안에 수분이 부족하거나, 주변이 너무 덥거나 건조하고, 아니면 기생충에 감염되었을 경우가 있어요.

치료법: 기니피그가 물을 잘 마시는지 확인해 주시고, 펠렛을 잘게 부셔서 물이랑 섞어서 죽처럼 만든다음에 먹이시는것도 좋아요. 기니피그가 그래도 계속 변비라면 수의사를 찾아가시는게 좋아요.

설사 (뭉고, 모양이 타원형이 아닌 변, 기니피그 항문에 설사가 묻어있는 경우)

기니피그 블로그를 운영하면서 질문중에 많은 분들이 기니피그 설사에 대해서 물어본적이 있는데요. 아무래도 기니피그 설사도 기니피그를 키우는 분들에게 많이 생기는 현상인거 같아요.

이유: 기니피그가 설사에 걸리는 이유는 참 다양해요. 박테리아 감염, 기생충, 바이러스 감염, 스트레스, 물기가 많은 야채, 그리고 과일 과다섭취.

치료법: 되도록이면 설사는 빨리 치료를 해주는게 좋아요.

설사에 관한 글은 밑에 링크를 클릭하시면 더 많은 정보를 보실수가 있을 거예요.

<http://blog.daum.net/kellysworld/6431667>

매복증 (대변이 항문에서 계속 쌓여서 안나오는 경우)

매복증일 경우, 보통은 나이가 많은 기니피그에게 생기는 걸로 들었어요. 아직 제 기니피그들은 어려서 이런 일은 경험해 본적이 없지만, 도움이 될까 해서 자료를 찾아봤어요.

이유: 대변이 항문에 계속 쌓여서 항문에서 대변이 밖으로 못나오는 현상이예요. 보통 나이가 많은 기니피그들, 그리고 아주 아픈 기니피그들에게서 많이 생긴다고 하네요.

치료법: 따뜻한 물로 적신 얇은헝겊으로 기니피그 항문을 적신다음에 쌓였던 대변이 어느정도 부드러워 졌으면 기니피그 항문에서 살살 쌓여있었던 대변을 빼주세요. 그런다음 항문에서 대변이 빠졌으면 항문 주변을 깨끗하게 닦아주세요. 그런 다음 수의사를 찾아가셔서 기니피그 항문 주변에 바를 약을 처방받는 방법도 좋아요. 그 이유는 기니피그 항문주변이 그동안 쌓였던 대변으로 의해 살짝 염증이 생겼을수도 있거든요.

체르니 님께서 하신 댓글 중 많은 분들도 궁금해 하실까봐 따로 "Question & Answer" 에다가 글을 씁니다.

체르니 님의 궁금댓글:

캘리언니!! 혹시 소변으로 건강을 알수있는 방법은 없나요????

제 답변입니다:

네, 병원에 가지 않고 소변으로 모든병을 알아내는 방법은 거의 없지만, 소변으로 통해서도 주인의 판단으로 간단한 질병과 기니피그에게 필요한 것을 알수가 있습니다.

기니피그의 소변에 피가 보인다면 무조건 병원으로 가셔서 검사를 받아봐야 되고요 (몸안에 결석, 요로감염증 등등...), 기니피그 소변이 좀 흰색을 띤다면 몸안에 칼슘이 많다는 증거니까 그때는 알파파 건초를 먹이면 티모시 건초로 바꿔주시면 되요.

결석에 관한글과 요로감염증에 관한 글들

<http://blog.daum.net/kellysworld/7838826> (요로감염증에 관한 글)

<http://blog.daum.net/kellysworld/7838825> (결석에 관한 글)

소변양이 적으면 탈수증일수도 있으니 기니피그가 물을 잘 마시는지 확인을 해주시고요, 그와 반대로 소변양이 엄청 많고 물을 엄청 많이 마시면 당뇨병일수도 있지만 당뇨병은 기니피그 몸에 다른 증상들도 나타난답니다.

<http://blog.daum.net/kellysworld/7838807> (당뇨병에 관한 글)

또 다른 경우는 물을 너무 많이 마신다면 기니피그 주변이 좀 덥다는 표시일수도 있으니 온도를 살짝 시원하게 해주시면 좋습니다.

동물병원에서 기니피그 소변검사를 받는것도 추천해 드리고 싶어요.

기니피그에게 여러 종류들의 기생충들이 존재하고 있어요. 그 많은 기생들 종류들중 위험한 기생충이 있는데 그게 바로 개선충 이라는 거예요. 기니피그 에게 개선충이 생기면 기니피그 목숨이 아주 위험해 진답니다.

그렇기 때문에 기니피그에게 개선충이 있을거 같으면 빨리 동물병원에 가셔야 되요.

개선충은 다른 기니피그 진드기와 달리 눈에 보이지 않기 때문에 기니피그에게 증상들이 보이면 꼭 수의사를 찾아가셔서 검사를 받으셔야 되요.

기니피그가 개선충에 감염 되었을때 나타나는 증상



- * 기니피그 털이 많이 얇아지고 털이 많이 빠져서 살이 다 보인다.
- * 기니피그가 너무 심하게 몸은 긁는다.
- * 기니피그 몸을 만지면 아파한다 (소리를 뽁뽁 지르거나 주인을 물려고 한다).
- * 너무 심하게 긁어서 몸에 상처가 난다.
- * 발작을 일으킨다.

나이가 아주 많이 어리거나 많이 든 기니피그들이 스트레스를 많이 받거나 더러운 환경에서 자라면 개선충에 감염이 쉽게 되요. 건강한 기니피그는 개선충에 감염될 확률이 아주 낮아요, 그 이유는 건강하면 그루밍을 많이 하게 되는 이유도 있고 또 다른 이유는 진드기 종류에 대한 면역이 다 강하기 때문이에요.

기니피그가 개선충에 감염이 되었을때 죽음까지 가는 이유는 개선충과 심한 굶음으로 의한 상처때문에 너무 아파서 음식을 못 먹게 되는데 기니피그가 음식을 못 먹으면 영양부족, 그리고 심하면 몸안에 수분이 없어져서 탈수증이 생겨서 죽게되요.

기니피그가 개선충 (진드기) 에 걸렸을때 병원에서 하는 치료법

주사: 병원에서는 기니피그가 진드기에 감염되었을때 가장많이 쓰는 약이 바로 ivermectin 이라는 주사를 통해 놓는 약이에요.

Ivermectin 은 고양이가 진드기에 감염 되었을때도 쓰는 약인데 기니피그에게도 잘 통하는 약이에요. 다만 양을 잘 조절해서 써야 되요. Ivermectin 은 임신한 기니피그에게도 안전한 약이지만 기니피그 몸무게가 340 g 보다 적으면 위험한 약이에요. 한꺼번에 많은 양을 주사하면 기니피그가 죽음까지 갈수 있기 때문에 적은 약을 1주일 마다 3번정도 주사해야 되요.

기니피그가 개선충에 감염이 되었으면 기니피그가 살고 있었던 케이지와 용품들을 깨끗이 청소하는게 중요해요.

참고로 기니피그에게 기생하는 진드기들은 사람에게 옮기지 않아요. 아주 민감한 사람들을 기니피그 진드기가 물긴 하겠지만 (물면 몸이 간질간질) 기니피그 몸에 기생하는것 처럼 기생하지는 않아요.

기니피그 수술할때



약간의 불편한 장면으로 인해 포토샵 처리~ ㅎㅎ

가끔씩 약으로 해결이 안되는 질병일 경우 수술을 해야될때가 있어요. 보통은 기니피그가 수술할때 중성화 시킬려고 수술을 많이 하는 경우가 있어요. 물론 다른 경우에도 수술을 해야 될때가 있어요, 예를 들어서 혹을 제거 해야 되는 수술, 암 세포 제거, 몸안에 결석 제거 등등. 수술은 고통스럽지만 그만큼 고통스러운 만큼 나쁜 병을 괜찮아 지게 만들기 때문에 기니피그에게 꼭 필요한 경우들이 많아요.

하지만, 안타깝게도 아직까지는 기니피그 수술을 잘하시는 수의사 선생님들이 별로 없기 때문에 수술을 잘 하시는 수의사 선생님을 찾아가는 제 제일로 중요해요. 하지만 가끔씩 기니피그 수술에 경험이 많은 수의사 선생님도 수술중 기니피그가 죽은 경우가 있어요 (그런 경우는 보통 기니피그가 마취약에 부작용을 일으킬 경우).

그럼 기니피그 수술에 대해 몇가지 알아보는 시간을 가지겠어요.

수술이 가장 좋은 방법일때

- * 임파선염을 제거할때
- * 자궁이 질병에 감염되었을때
- * 자궁이 비틀렸을때 (꼬였을때)
- * 암컷 기니피그가 출산할때 아기 기니피그가 잘 안나오는 경우
- * 암
- * 결석제거

수술전 기니피그 금식기간

이 부분에서 아직까지는 많은 부분이 확실하지는 않아요, 다만 1~2 시간 아니면 4~8 시간 이라고 하네요.

* 1~2 시간: 기니피그를 무리해서 밤새 금식을 안해도 된다고 해요. 그 이유는 기니피그는 음식을 먹으면 소화를 빨리 시키기 때문에 4~8 시간 동안의 금식은 무리라고 생각을 하고 있는 수의사 선생님들이 계세요.

* 4~8 시간: 가끔씩 기니피그가 마취되었을때 기니피그 목 안에서 음식이 남아있는 경우가 있다고 해요. 그래서 어떤 분들은 4~8 시간 동안 기니피그가 금식을 해야 그런 경우를 대비할수 있다고 하네요.

* 중요한건 경험이 많은 수의사 선생님일수록 기니피그를 보고 정확히 판단하실수 있을거예요.

마취와 수술 후 진통제

기니피그에게 안전한 마취약

* Isoflurane (아이소플로란): 흡입마취제 입니다. 양을 잘 조절해서 기니피그가 마취약에 의해 위험해 지는 일이 없어야 되요.

* Sevoflurane: 역시 흡입마취제 중 하나예요. 사람 아기가 수술 할때도 이 마취제를 쓴다고 해요. 역시 양을 잘 조절해야 됩니다.

진통제

기니피그 수술 후 진통제를 주지만 진통제를 안주시는 수의사 선생님 들도 계세요. 그럴때는 특별히 기니피그에게 진통제가 필요 없는 수술일때 안주시는데, 기니피그가 너무 아파할때는 다시 수의사 선생님께 가서 진통제를 달라고 하시면 되요.

기니피그가 아파할때 하는 행동

- * 이빨을 천천히 간다.
- * 털이 세워져 있다.
- * 제대로 서있지 않고 몸이 구부러져 있다.
- * 잘 걷지 못하고 폴짝폴짝 뛰면서 움직인다.
- * 음식을 잘 못먹는다 (음식을 못먹을 경우 직접 손으로 먹이셔야 되요).
- * 사람이 추울때 몸을 부르르 떨듯이 기니피그가 몸을 떤다.

진통제 종류:

- * Meloxicam (종류: 메타캠, 모빅): 진통제 중 하나로 아픔을 잘 막아주고 있어서 많은 수의사 선생님 들이 쓰시고 계세요.
- * Carprofen (Rimadyl): 기니피그 콩팥하고 간에 건강하면 쓸수있는 진통제예요.

수술후

수술이 성공했지만 수술후 관리하는게 더 중요해요. 잘못 관리를 하면 수술한 부분이 덧날수도 있고 또는 더 심각한 상황으로 번지기도

해요.

- * 케이지 안에 바닥은 다 수건을 깔아주시고 수건을 매일매일 갈아 주세요.
- * 기니피그를 들어 올리실때 손으로 잡으시면 기니피그 수술한 부분이 열릴수도 있으니까 되도록이면 박스를 써서 기니피그를 들어 올리시는게 좋아요. 기니피그 사이즈에 맞는 박스를 케이지 안에 두시고 기니피그가 그 안에 들어갔으면 그때 박스랑 꺼내시면 되요.
- * 너무 더운곳이나 추운곳에다가 놓으시면 안되요.
- * 음식을 안먹을 경우 직접 손으로 먹이셔야 되요 (바늘없는 주사기를 이용하세요).
- * 가끔씩 수술한 기니피그의 대변이 작게 나온다거나 아예 안나오는 경우가 있는데 그럴때는 재빨리 수의사 선생님께 대려가셔야 되요.
- * 수술한 부분이 잘못되서 열렸을 경우 수의사 선생님께 다시 찾아가세요.
- * 수술한 부분에 혹같은게 생겼거나 부어 있으면 나쁜 병균에 감염 되었다는 증거니까 다시 동물병원에 가서서 검사를 받으셔야 되요.

기니피그의 질병과 치료법에 대해서

우리집 이야기 <http://blog.daum.net/kellysworld> 블로그

Kelly 저자

2011.01.27 09:50:23 발행일

 블로그